



ANEXO 08

LISTA DE FAUNA ENCONTRADA NA RESERVA NATURAL GUARICICA

Relação de táxons de macroinvertebrados bentônicos encontrados na Reserva Natural Guaricica

TÁXONS	Estágio / Nome vulgar
Crustaceae	
<i>Aegla</i> sp.	
<i>Trichodactylus fluviatilis</i> (Latreille, 1828)	
<i>Macrobrachium potiuna</i> (Müller, 1880)	
<i>Macrobrachium olfersi</i> (Wiegmann, 1836)	
<i>Macrobrachium acanthurus</i> (Wiegmann, 1836)	
<i>Uca</i> sp.	
<i>Ucides cordatus</i> (Linnaeus, 1763)	
<i>Aratus pisonii</i> (H. Milne Edwards, 1837)	
<i>Sesarma rectum</i> Randall, 1840	
Insecta	
Plecoptera	
Anisoptera	náiades
Zygoptera	náiades
Megaloptera	larvas
Hemiptera, Gerridae	
Hemiptera, Belostomatidae	barata-d'água
Hemiptera, Naucoridae	
Hemiptera, Notonectidae	
Hemiptera, Nepidae	
Coleoptera, Dytiscidae	
Coleoptera n.i.	
Molusca	
Bivalvia, Mytilidae	bacucu
Gastropoda, Pulmonata	
Annelida	
Hirudinea	sanguessuga

Baseado em Calluf, 2003.

Relação de espécies de formigas coletadas na Reserva Natural Guaricica

Subfamília	Gênero/espécie
Amblyoponinae	
	<i>Fulakora armigera</i>
	<i>Fulakora elongata</i>
Dolichoderinae	
	<i>Azteca</i> sp. 1
	<i>Dolichoderus</i> sp 1
	<i>Linepithema leucomelas</i>
	<i>Linepithema iniquum</i>
	<i>Linepithema pulex</i>
	<i>Tapinoma</i> sp 1
Dorylinae	
	<i>Eciton burchelli</i>
	<i>Labidus coecus</i>

Labidus praedator

Neivamyrmex sp 1

Ectatomminae

Ectatomma edentatum

Gnamptogenys horni

Gnamptogenys rastrata

Gnamptogenys striatula

Gnamptogenys reichenspergeri

Gnamptogenys sp 1

Typhlomyrmex major

Typhlomyrmex pusillus

Formicinae

Acropyga decedens

Acropyga fuhrmanni

Acropyga goeldii

Brachymyrmex delabiei

Brachymyrmex sp 1

Brachymyrmex sp 2

Camponotus vitattus

Camponotus sp 1

Myrmelachista sp 1

Nylanderia sp 1

Nylanderia sp 2

Nylanderia sp 3

Nylanderia sp 4

Heteroponerinae

Heteroponera dentinodis

Heteroponera dolo

Heteroponera inermis

Heteroponera mayri

Heteroponera microps

Heteroponera panamensis

Myrmicinae

Acanthognathus brevicornis

Acanthognathus ocellatus

Acanthognathus rudis

Acromyrmex subterraneus

Acromyrmex disciger

Apterostigma sp 1

Apterostigma sp 2

Apterostigma sp 3

Basiceros convexiceps

Crematogaster limata

Crematogaster pr limata
Crematogaster nigropilosa
Crematogaster sp 1
Crematogaster sp 2
Cryptomyrmex boltoni
Cyphomyrmex rimosus
Cyphomyrmex pr. rimosus
Cyphomyrmex minutus
Eurhopalothrix bruchi
Hylomyrma reitteri
Lachnomyrmex plaumanni
Megalomyrmex drifti
Myrmicocrypta sp 1
Octostruma iheringi
Octostruma rugifera
Carebara sp 1
Oxyepoecus pr rosai
Pheidole aper
Pheidole angusta
Pheidole bucculenta
Pheidole dyctiata
Pheidole subarmata
Pheidole maseni
Pheidole sarcina
Pheidole gertrudae
Pheidole guilelmimuelleri
Pheidole pr rosae
Pheidole sp 1
Pheidole sp 2
Pheidole sp 3
Pheidole sp 4
Pheidole sp 5
Pheidole sp 6
Pheidole sp 7
Pheidole sp 8
Pheidole sp 9
Pheidole sp 10
Pheidole sp 11
Pheidole sp 12
Pheidole sp 13
Procryptocerus convergens
Rogeria sp 1
Solenopsis virulens

Solenopsis sp 1
Solenopsis sp 2
Solenopsis sp 3
Solenopsis sp 4
Solenopsis sp 5
Solenopsis sp 6
Strumigenys *appretiata*
Strumigenys *crassicornis*
Strumigenys *denticulata*
Strumigenys *eggersi*
Strumigenys *elongata*
Strumigenys *gytha*
Strumigenys *louisianae*
Strumigenys *schmalzi*
Strumigenys *schulzi*
Strumigenys *subedentata*
Strumigenys *urrhobia*
Trachymyrmex sp
Wasmannia *affinis*
Wasmannia *auropunctata*
Wasmannia *lutzi*

Ponerinae

Hypoponera *foreli*
Hypoponera *opaciceps*
Hypoponera sp 1
Hypoponera sp 2
Hypoponera sp 3
Hypoponera sp 4
Hypoponera sp 5
Hypoponera sp 6
Hypoponera sp 7
Hypoponera sp 8
Hypoponera sp 9
Hypoponera sp 10
Leptogenys gr. *luederwalti* sp.
Leptogenys *crudelis*
Leptogenys *iheringi*
Odontomachus *affinis*
Odontomachus *chelifer*
Odontomachus *haematodus*
Odontomachus *meinerti*
Pachycondyla *striata*

Pachycondyla lenis

Pachycondyla harpax

Proceratiinae

Discothyrea neotropica

Discothyrea sexarticulata

Pseudomyrmecinae

Pseudomyrmex gracilis

Baseado em Marques, 2017

Lista de espécies de peixes encontradas na Reserva Natural Guaricica

TÁXONS	NOME COMUM
Familia Achiridae	
<i>Achirus lineatus</i> (Linnaeus 1758)	Linguado-de-água-doce
Familia Ariidae	
<i>Genidens barbatus</i> (Lacépède, 1803)	Bagre-branco, cumbaca, cabeçudo, bagre-cachola
<i>Genidens genidens</i> (Cuvier, 1829)	Bagre-do-natal, bagre-mandi, bagre-branco
<i>Netuma barba</i> (Lacépède 1803)	Bagre-branco
Familia Atherinopsidae	
<i>Atherinella brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	Charuto, João-duto, manjuba, manjuba-verde
Familia Auchenipteridae	
<i>Glanidium</i> sp.	---
Familia Belontiidae	
<i>Strongylura marina</i> (Walbaum, 1792)	Peixe-agulha
Familia Callichthyidae	
<i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	Tambuatá
<i>Corydoras barbatus</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Coridora-barbudo
<i>Scleromystax barbatus</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Coridora-bandada
Familia Carangidae	
<i>Oligoplites saliens</i> (Bloch, 1793)	Gaivira, guajuvira, salteira
<i>Oligoplites saurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Gaivira, guajuvira, salteira
Familia Centropomidae	
<i>Centropomus parallelus</i> Poey, 1860	Robalo
<i>Centropomus undecimalis</i> (Bloch, 1792)	Robalo
Familia Characidae	
<i>Astyanax</i> aff. <i>Scabripinnis</i>	Lambari
<i>Astyanax scabripinnis</i> Jenyns, 1842	Lambari
<i>Astyanax</i> sp. 1	---
<i>Astyanax</i> sp. 2	---
<i>Bryconamericus microcephalus</i>	Lambari
<i>Deuterodon langei</i>	Lambarizinho
<i>Hollandichthys multifasciatus</i> Eigenmann & Norris, 1900	Piabinha
<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> Ellis, 1911	Tetra-amarelo
<i>Hyphessobrycon griemi</i> Hoedeman, 1957	Lambarizinho
<i>Hyphessobrycon luetkeni</i> Boulenger, 1887	Lambarizinho
<i>Hyphessobrycon reticulatus</i> Ellis, 1911	Lambari-prata
<i>Mimagoniates microlepis</i> (Steindachner, 1876)	---
<i>Oligosarcus hepsetus</i> (Cuvier, 1817)	Dentudo, saicanga

Familia Cichlidae

<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Cará
<i>Cichlasoma facetum</i> (Jenyns, 1842)	Acará-camaleão
<i>Crenicichla lacustris</i> (Castelnau, 1855)	Joaninha
<i>Crenicichla tingui</i> (Kullander & de Lucena, 2006)	---

Familia Clupeidae

<i>Platanichthys platana</i> (Regan, 1917)	Sardinha
--	----------

Familia Crenuchidae

<i>Characidium lanei</i> Travassos, 1967	Charutinho
<i>Characidium pterostictum</i>	Canivete
<i>Characidium</i> sp. 1	---
<i>Characidium</i> sp. 2	---
<i>Characidium</i> sp. 3	---
<i>Characidium</i> sp. 4	---
<i>Characidium</i> sp. 5	---
<i>Characidium</i> sp. 6	---
<i>Characidium</i> sp. 7	---
<i>Characidium</i> sp. 8	---

Familia Curimatidae

<i>Cyphocharax santacatarinae</i> (Fernández-Yépez, 1948)	Peixe-duro, roncadador, saguairu
---	----------------------------------

Familia Eleotridae

<i>Dormitator maculatus</i> (Bloch 1792)	Amoré
--	-------

Familia Engraulidae

<i>Anchoiella lepidentostole</i> (Fowler, 1911)	Manjuba
<i>Anchoa parva</i> (Meek & Hildebrand, 1923)	Achovinha
<i>Cetengraulis edentulus</i> (Cuvier, 1829)	Arenque
<i>Lycengraulis grossidens</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Pilobeta, arenga, manjubão

Familia Erythrinidae

<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Jejú, traíra-pixuna
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	Traíra, taraíra, tararira

Familia Gerreidae

<i>Diapterus rhombeus</i> (Cuvier, 1829)	Caitipa-mojarra
<i>Eugerres brasilianus</i> (Cuvier, 1830)	Carapeba-listrada
<i>Eucinostomus melanolepterus</i> (Bleeker, 1863)	Carapicu

Familia Gobiidae

<i>Awaous tajasica</i> (Lichtenstein, 1822)	Gobi-de-rio, amoré-guaçu
<i>Bathygobius soporator</i> (Valenciennes, 1837)	Amboré, aimoré
<i>Ctenogobius shufeldti</i> (Jordan & Eigenmann, 1887)	Gobi-de-água-doce
<i>Gobionellus oceanicus</i> (Pallas, 1770)	Amoré, boca-de-fogo, miroró
<i>Evorthodus lyricus</i> (Girard, 1858)	---

Familia Gymnotidae

<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	Carapó, sarapó, carapó-tuvira
<i>Gymnotus</i> sp.	---

Familia Hemiramphidae

<i>Hyporhamphus unifasciatus</i> (Ranzani, 1841)	Agulha-branca
--	---------------

Familia Heptapteridae

<i>Acentronichthys leptos</i> Eigenmann & Eigenmann 1889	Bagrinho
<i>Pimelodella pappenheimi</i> Ahl, 1925	Mandi-chorão
<i>Pimelodella</i> sp.	---
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Bagre, jundiá, jandiá
<i>Rhamdia</i> aff. <i>Quelen</i>	Bagre, jundiá, jandiá
<i>Rhamdioglanis frenatus</i> Ihering, 1907	Mandi

Familia Loricariidae

"Loricariidae" sp. A	---
"Loricariidae" sp. B	---
"Loricariidae" sp. C	---

<i>Ancistrus multispinis</i> (Regan, 1912)	Cascudo-roseta
<i>Hemipsilichthys</i> sp.	---
<i>Hisonotus leucofrenatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1908)	Limpa-vidro, cascudinho
<i>Hypostomus punctatus</i> Valenciennes, 1840	Cascudo
<i>Kronichthys</i> cf. <i>subteres</i>	Bagre
<i>Kronichthys lacerta</i> (Nichols, 1919)	Cascudinho
<i>Kronichthys</i> sp.	---
<i>Microlepidogaster leucofrenatus</i> Ribeiro, 1908	---
<i>Pseudotothyris obtusa</i> (Ribeiro, 1911)	Cascudinho
<i>Rineloricaria latirostris</i> (Boulenger, 1900)	Cascudo-chicote-peludo
Familia Mugilidae	
<i>Mugil curema</i> (Valenciennes, 1836)	Parati, parati-olho-de-fogo, paratibu, solé
<i>Mugil platanus</i> Günther, 1880	Tainha, curimã
<i>Mugil</i> sp.	---
Familia Paralichthyidae	
<i>Citharichthys spilopterus</i> Günther, 1862	Linguado
<i>Etropus crossotus</i> Jordan & Gilbert, 1882	Linguado
Familia Poeciliidae	
<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	Barrigudinho, lebiste, bandeirinha
<i>Phalloceros</i> sp. 3	---
<i>Poecilia vivipara</i> Bloch & Schneider, 1801	Barrigudinho, guaru
Familia Pseudopimelodidae	
<i>Microglanis parahybae</i> (Steindachner, 1880)	---
Familia Sciaenidae	
<i>Bairdiella ronchus</i> (Cuvier, 1830)	Cangauá
<i>Cynoscion acoupa</i> (Lacepède, 1801)	Pescada-amarela
<i>Cynoscion leiarchus</i> (Cuvier, 1830)	Pescada-branca
<i>Micropogonias furnieri</i> (Desmarest, 1823)	Corvina
Familia Symbranchidae	
<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795	Muçum, peixe-cobra, enguia-de-água-doce
Familia Syngnathidae	
<i>Pseudophallus mindii</i> (Meek and Hildebrand, 1923)	Peixe-cachimbo
Familia Rivulidae	
<i>Rivulus</i> sp. 1	---
<i>Rivulus</i> sp. 2	---
Familia Tetragonopterinae	
<i>Deuterodon langei</i> Travassos, 1957	Lambari
<i>Sphoeroides testudineus</i> (Linnaeus, 1758)	Baiacu-mirim
Familia Trichomycteridae	
<i>Listrura boticario</i> de Pinna and Wosiacki, 2002	Bagrinho

Baseado parcialmente em Abilhôa e Duboc, 2003.

Lista de espécies de anfíbios encontradas na Reserva Natural Guaricica

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS
Familia Bufonidae			
<i>Rhinella abei</i> (Baldissera-Jr, Caramaschi & Haddad, 2004)		flo aab	
<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Rhinella</i> gr. <i>crucifer</i>	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Rhinella</i> gr. <i>margaritifera</i>	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i> Izecksohn, 1968	sapo	flo aab ter aqu	
Familia Centrolenidae			
<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924)	sapinho	flo arb aqu	vulnerável
Família Hemiphysalidae			
<i>Fritziana fissilis</i> (Miranda Ribeiro, 1920)		flo	

Familia Hylidae			
<i>Aplastodiscus ehrhardti</i> (Müller, 1924)		flo, arb	
<i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus microps</i> (Peter, 1872)		flo, arb	
<i>Dendropsophus minutus</i> (Peter, 1872)		flo, arb	
<i>Dendropsophus nahdereri</i> (B. Lutz & Bokermann, 1963)		flo, arb	
<i>Dendropsophus weneri</i> (Cochran, 1952)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Hypsiboas semilineatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841)	perereca	flo arb aqu	vulnerável
<i>Oloolygon perpusilla</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1939)		flo, arb	
<i>Oloolygon littoralis</i> (Pombal & Gordo, 1991)		flo, arb	
<i>Phyllomedusa distincta</i> A. Lutz in B. Lutz, 1950	perereca-verde	flo arb aqu	
<i>Pseudis minuta</i> Günther, 1858	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax</i> aff. <i>alter</i>	perereca	flo aqu	
<i>Scinax argyreornatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax imbegue</i> Nunes, Kwet & Pombal, 2012		flo arb	
<i>Scinax littoralis</i> (Pombal & Gordo, 1991)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax perereca</i> Pombal, Haddad & Kasahara, 1995	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax tymbamirim</i> Nunes, Kwet & Pombal, 2012		flo arb	
<i>Trachycephalus mesophaeus</i> (Hensel, 1867)	perereca	flo arb aqu	
Familia Leiuperidae			
<i>Physalaemus</i> aff. <i>marmorata</i>	rãzinha	flo aab ter aqu	
Familia Leptodactylidae			
<i>Adenomera</i> gr. <i>bokermanni</i>		flo arb	
<i>Adenomera</i> cf. <i>marmorata</i> (Steindachner, 1867)		flo arb	
<i>Leptodactylus latrans</i> (= <i>ocellatus</i>) (Steffen, 1815)	rã	flo ter aqu	
<i>Leptodactylus notoaktites</i> Heyer, 1978	rã	flo ter aqu	
Família Odontophrynidae			
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)		flo	
Família Phyllomedusidae			
<i>Phyllomedusa distincta</i> A. Lutz in B. Lutz, 1950		flo	
Familia Hylodidae			
<i>Hylodes heyeri</i> Haddad, Pombal & Bastos, 1996		flo ter arb aqu	vulnerável
<i>Hylodes</i> gr. <i>nasus</i>		flo ter arb aqu	vulnerável
Familia Craugastoridae			
<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-das-matas	flo arb aqu	vulnerável
Familia Brachycephalidae			
<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-das-matas	flo arb aqu	
<i>Ischnocnema henselii</i> (Peters, 1872)		flo arb fos	
<i>Ischnocnema sambaqui</i> (Castanho & Haddad, 2000)		flo arb fos	
Familia Ceratophryidae			
<i>Ceratophrys aurita</i> (Raddi, 1823)	sapo-untanha	flo ter aqu	vulnerável
Familia Cycloramphidae			
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo	flo ter aqu	
Familia Microhylidae			
<i>Elachistocleis ovalis</i> (Schneider, 1799)	sapinho	aab ter fos aqu	
<i>Elachistocleis bicolor</i> (Valenciennes in Guérin-Menéville, 1838)		flo arb	

Baseado parcialmente em Segalla (2003) e Marques (2017)

Legenda Ambiente: flo = floresta, aab = áreas abertas; aqu = aquático, fos = fossorial; ter = terrícola; arb = arborícola

Lista de espécies de répteis encontrados na Reserva Natural Guaricica

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS
TESTUDINES			
Familia Chelidae			
<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado	aq (lt)	fr
Familia Cheloniidae			
<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)	tartaruga-cabeçuda	aq (ma)	am
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	tartaruga-verde	aq (ma)	am
CROCODYLIA			
Familia Alligatoridae			
<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	jacaré-de-papo-amarelo	aq (ln, ma), mn	fr am
SQUAMATA - LACERTILIA			
Familia Polychrotidae			
<i>Enyalius iheringii</i> Boulenger, 1885	camaleão	fl	fr
Familia Gekkonidae			
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	lagartixa-de-parede	fl, re, ab	fr
Familia Anguidae			
<i>Diploglossus fasciatus</i> (Gray, 1831)	lagarto-coral	fl	pfr
<i>Ophiodes fragilis</i> Raddi, 1820	cobra-de-vidro	fl, re, ab	fr
Familia Gymnophthalmidae			
<i>Placosoma glabellum</i> (Peters, 1870)	lagarto	fl, re, ab	fr
Familia Teiidae			
<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto, teiú	fl, re, mn, ab	fr
SQUAMATA - AMPHISBAENIA			
Familia Amphisbaenidae			
<i>Amphisbaena microcephala</i> (Wagler, 1824)	cobra-cega	fl, re, ab	fr
SQUAMATA - SERPENTES			
Familia Colubridae			
<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl, re, ab	fr
<i>Chironius fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl, ab (?)	pfr
TÁXONS			
<i>Chironius multiventris</i> Schmidt & Walker, 1943	cobra-cipó, voadeira	fl, re, ab	
<i>Chironius laevicollis</i> Dixon, Wiest & Cei, 1993	cobra-cipó, voadeira	fl, ab	fr
<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana	fl, re	fr
Familia Dipsadidae			
<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	muçurana, bairú	fl	rr am
<i>Dipsas incerta</i> (Jan, 1863)	dormideira	fl	in
<i>Dipsas neivai</i> Amaral, 1923	dormideira	fl	in
<i>Dipsas indica</i> Laurenti, 1768	dormideira	fl	rr
<i>Echianthera cephalostriata</i> Di-Bernardo, 1996	---	fl	pfr
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	coral-falsa	fl, re, ab	fr
<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1825)	cobra-d'água	aq (lt, ln)	fr
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	dormideira	fl	rr
<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	fl, re, mn, ab, aq , ln, ma)	fr
<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	coral-falsa	fl, re	fr
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira	fl, re, ab	fr
<i>Xenodon neuwiedi</i> Günther, 1863	jararaca-falsa	fl	fr
Familia Elapidae			
<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	fl, re, ab	fr
Familia Viperidae			
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1924)	jararaca	fl, re, ab	fr
<i>Bothrops jararacussu</i> Lacerda, 1884	jararacuçu	fl, re, ab	fr

Baseado parcialmente em Morato, 2003.

Legenda: Ambientes: fl: florestas; re: restingas; mn: mangues; ab: áreas abertas; aq: aquático, sendo (lt): lótico; (ln): lântico; (ma): marinho; **hábitos:** fo: fossorial; sf: semifossorial; ter: terrícola; aq: aquático *sensu stricto*; saq: semi-aquático; sab: semi-arborícola; ab: arborícola; **Status:** fr: frequente; pfr: pouco frequente; rr: raro; am: ameaçado de extinção; in: insuficientemente

Lista de espécies de aves encontrados na Reserva Natural Guaricica

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
Família Tinamidae		
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	fod
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	fod-cp-sec
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	inhambu-chororó	fod
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	cap-cp-sec
Família Phalacrocoracidae		
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	fpfm-fpf
Família Fregatidae		
<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	fragata	Aq
Família Ardeidae		
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	socó-grande	fpfm-fpf
<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	garça-branca-grande	fpfm-fpf
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	fpfm-fpf
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	fpfm-fpf
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	pa
<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	fpfm-fpf
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	fpfm-fpf
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Gmelin, 1789)	savacu	fpfm-fpf
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	fpfm-fpf
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	socó-boi-escuro	fpfm-fpf
Família Threskiornithidae		
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	ca-cp-sc
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	fpfm-fpf
Família Cathartidae		
<i>Cathartes aura</i> Linnaeus, 1758	urubu-de-cabeça-vermelha	fod-ca-cp-sc
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-comum	fod-ca-cp-sc-aa
Família Anatidae		
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	fpfm-fpf
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	fpfm-fpf
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	fpfm-fpf
Família Accipitridae		
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	fod-sc
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Accipter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	fod
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	fod
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	fod
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	fod
Família Falconidae		
<i>Herpethotes cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Polyborus plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	gavião-relógio	fod
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	fod

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiri-quiri	ca-cp-sc-aa
Família Cracidae		
<i>Penelope supercilialis</i> Temminck, 1815	jacupemba	fod-cp-sc
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	fod-cp-sc
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	fpfm-fod
<i>Pipile jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	fod
Família Odontophoridae		
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	fod
Família Rallidae		
<i>Aramides cajanea</i> (Müller, 1776)	saracuraçu	fpfm-fpf
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	fpf-fod-sc
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracurinha-da-mata	fpfm-fpf
<i>Rallus nigricans</i> Vieillot, 1819	saracura-sanã	fpfm-fpf
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	fpfm-fpf
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	pinto-d'água	fpfm-fpf
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	pinto-d'água-comum	fpfm-fpf
Família Jacanidae		
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	fpfm-fpf
Família Charadriidae		
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	fpf
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	batuíra-de-bando	fpfm
Família Scolopacidae		
<i>Actitis macularia</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	fpfm
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja	fpf
Família Laridae		
<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823	gavotão	Aq
Família Columbidae		
<i>Columba picazuro</i> Temminck, 1813	pomba-asa-branca	fod-ca-cp-sc
<i>Columba cayennensis</i> Bonnaterre, 1792	pomba-galega	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818	pomba-amargosa	fod-sc
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	ca-cp-aa
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	fod-ca-cp-sc
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga	fod-cp-sc
Família Psittacidae		
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	fod-sc
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Taczanowski, 1883)	tuim-de-asa-azul	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiu-cuiu	fod-sc
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa	fpfm-fod-sc
<i>Tricharia malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	
Família Cuculidae		
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	fod-cp-sc
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	ca-pa-aa
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	ca-pa-aa
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci-do-campo	cp-ca-pa
Família Tytonidae		
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	suindara	aa
Família Strigidae		
<i>Otus atricapillus</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo	fod-sc-cp
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	fod-sc
<i>Speotyto cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	pa-aa

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
Família Nyctibiidae		
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	fod-sc
Família Caprimulgidae		
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1788)	tuju	fod-sc
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango-comum	fod-sc
Família Apodidae		
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	taperá-de-barriga-cinza	fod-ca-cp-sc-aa
<i>Chaetura andrei</i> Berlepsch & Hartert, 1902	taperá-do-temporal	fod-ca-cp-sc-aa
Família Trochilidae		
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-grande-da-mata	fod-sc-cp
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	fod-sc-cp
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	tesourão	fod-sc-cp
<i>Melanotrochilus fuscus</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	fpfm-fod-cp
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	fod-cp
<i>Lophornis chalybea</i> (Vieillot, 1822)	tufinho-verde	fod-cp
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	fpfm-fpf-fod-cp-sc
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	fpf-fod-sc-cp
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	
Família Trogonidae		
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1758	surucuá-de-barriga-amarela	fod-cp-sc
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-de-peito-azul	fod-cp-sc
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-dourado	fod-cp-sc
Família Alcedinidae		
<i>Ceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	fpfm-fpf
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	fpfm-fpf
Família Momotidae		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	fod-sc
Família Bucconidae		
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	joão-bobo	fod-sc
Família Ramphastidae		
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	saripoca-poca	fod-sc
<i>Bailloniopsis bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	fod-sc
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	fod-sc
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	fod-sc
Família Picidae		
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	picapauzinho	fod-cp-sc
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	pa-ca-aa
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	fod-cp-sc
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	fpfm-fpf
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-velho	fod-cp-sc
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito	fod-sc
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	fod-sc
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-carijó	fod-cp-sc
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1819)	pica-pau-rei	Fod
Família Dendrocolaptidae		
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-pardo	fod-sc
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cabeça-cinza	fod-cp-sc
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	Fod
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1824	arapaçu-grande	fod-sc
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamoso	fod-sc
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	fod-sc

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
Família Furnariidae		
<i>Anabacerthia lichtensteini</i> (Cabanis & Heine, 1859)	limpa-folha-ocráceo	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	ca-cp-pa-aa
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	fod-ca-cp-sc
<i>Synallaxis spixi</i> Slater, 1856	joão-tenenem	fod-ca-cp
<i>Certhiaxis cinnamomea</i> (Gmelin, 1788)	curutié	fpm-fpf
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	fod-sc
<i>Philydor rufus</i> Vieillot, 1818	limpa-folha-de-testa-canela	fod-sc
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	fod-sc
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	bico-virado-do-sul	fod-sc
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	fod-sc
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miudo	fod-sc
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétrières, 1835)	vira-folhas	fod-sc
Família Thamnophilidae		
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	fod
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	fod-sc
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara-preta	fod
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	fod-sc-cp-ca
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	fod-sc
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	fod-sc-cp
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-estrelada	fod
<i>Herpsilochmus rufomarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-ruiva	fod
<i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	trovoada-ocre	fod
<i>Dryophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	fod
<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	dituí	fod
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	fod-sc-cp
<i>Myrmeciza squamosa</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-da-grota	fod
<i>Stymphalornis acutirostris</i> Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995	bicudinho-do-brejo	fpm-fpf
Família Formicariidae		
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1818)	tovaca-campainha	fod
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu-malhado	fod
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	pinto-da-mata-coroado	fod
Família Conopophagidae		
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente-marrom	fod-sc-cp-ca
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	chupa-dente-de-mascara	fod
Família Rhinocryptidae		
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830		
<i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho-perereca	
Família Tyrannidae		
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	fod
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	cp-ca
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	maria-da-copa	cp-ca
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	fod-sc-cp-ca
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-verde	fod-sc-cp-ca
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	fod-sc
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	fod-sc
<i>Phylloscartes paulistus</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar	fod
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	fop-sc-cp
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririnho-de-óculos	fod
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	spit-spit	fod
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	fod-sc-cp
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	fod

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
<i>Platyrrhynchus leucoryphus</i> (Wied, 1831)	patinho-grande	fod
<i>Platyrrhynchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho-de-garganta-branca	fod-sc
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Müller, 1776)	felipe-de-peito-riscado	pa-ca-cp
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho-de-peito-dourado	fod-sc
<i>Lathrotriccus eulari</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	fod-sc
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu-quieto	fod-sc
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	maria-viuvinha	fod-sc-cp-ca
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	tinguaçu	fod
<i>Machetornis rixosus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	pa-ca-cp-sc-aa
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	maria-assobiadeira	fod-sc-cp
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irre	fod-sc-cp
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi-verdadeiro	fod-sc-cp-ca-pa
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	nei-nei	fod-sc-cp-ca-pa
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bem-te-vi-de-coroa-vermelha	fod-sc-cp-ca-pa
<i>Conopias trivirgata</i> (Wied, 1831)	bem-te-vi-pequeno	fod-sc
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776)	bem-te-vi-rajado	fod-sc-cp
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	fod-sc-cp
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	cp-ca
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri-tropical	cp-ca-pa-aa
<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	tesoura	ca-pa-aa
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	fod-sc-cp
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	araponguinha-de-rabo-preto	fod-sc-cp
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	araponguinha-de-cara-preta	fod-sc-cp
Família Pipridae		
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim-verde	fod-sc
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira-branca	fod-sc-cp
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará-dançarino	fod-sc-cp-ca
Família Cotingidae		
<i>Carpornis melanocephalus</i>	sabiá-pimenta	fod
<i>Carpornis cuculatus</i> (Swainson, 1821)	corocochó	fod
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-sc
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	fod
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	cririó-suisso	fod
Família Oxyruncidae		
<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	bico-agudo	fod
Família Hirundinidae		
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-testa-branca	fpfm-fpf
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco	fpf-ca-pa-aa
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	ca-pa-aa
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	
Família Troglodytidae		
<i>Thryothorus longirostris</i> Vieillot, 1819	garrincha-açu	fpfm-fpf
<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1808	corruíra	cp-ca-pa-aa
Família Muscicapidae		
Subfamília Turdinae		
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1851	sabiá-poca	fod-sc-cp-ca
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	fod-sc-cp

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
<i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-preta	fod
Subfamília Sylviinae		
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	fod-sc-cp
Família Motacilidae		
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro	cp-ca
Família Vireonidae		
<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviara	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara-boreal	
Família Emberizidae		
<i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776)	tico-tico-verdadeiro	cp-ca-pa-aa
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	pa-ca-cp-aa
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	pa-ca-cp-aa
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	coleirinha	pa-ca-cp-aa
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1766)	bigodinho	fpf-pa-ca-cp-aa
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pichochó	fod
<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	cp-ca-fpf
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-pimenta	fod-
Família Thraupidae		
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-da-mata	fod-sc-cp
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	gurundi	fod-sc-cp
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	fod
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	fod-sc-cp
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-da-mata	fod
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	fod
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinza	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaço-de-encontro-amarelo	fod-sc-cp
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viuva	fod-sc-cp
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	fod-sc-cp
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	fod
<i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776)	sete-cores	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776)	saira-de-lenço	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	fod-sc-cp-ca-aa
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	fod-sc-cp
Família Tersinidae		
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	fod-sc-cp-ca
Família Parulidae		
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita-do-sul	fod-sc-cp
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	fpfm-fpf-fod-cp-ca
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Liechtenstein, 1830)	pula-pula-coroado	fod-sc-cp
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	fpf-fod
Família Coerebidae		
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	sc-cp-ca-aa
Família Icteridae		
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	fpf-fod-sc-cp
<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	policia-inglesa-do-sul	ca-pa-aa
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	melro, chupim	ca-pa-aa
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim-gaudério	ca-pa-aa
Família Fringillidae		
<i>Carduelis magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo-de-cabeça-preta	pa-ca-cp-aa

TÁXONS	NOME VULGAR	AMBIENTE
Família Passeridae		
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal-doméstico	aa
Família Corvidae		
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	fod-sc-cp

Baseado parcialmente em Boçon, 2003

Legenda para vegetação e tipos ambientais: **fpfm** - formações pioneiras de influência fluviomarinha; **fpf** - formações pioneiras de influência fluvial; **fod** - floresta ombrófila densa primária; **pa** - pastagem; **ca** - fase inicial de floresta (capoeira); **cp** - fase intermediária de floresta (capoeirão); **sc** - fase avançada de floresta (floresta secundária); **aa** - áreas alteradas; **aq** - ambientes aquáticos.

Lista de espécies de mamíferos verificados na Reserva Natural Guaricica

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTE	STATUS
família Didelphidae			
<i>Didelphis aurita</i>	gambá-de-orelha-preta		
<i>Didelphis albiventris</i> Lund, 1840	gambá	fodtb; fodsm;	
<i>Philander frenata</i> (Olfers, 1818)	cuíca -de-quatro-olhos	fodsm;	
<i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	cuíca-d'água	fpif	
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	cuíca	fodtb; fodsm; fpif	
<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	fodsm	
família Dasypodidae			
<i>Dasypus novencinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-galinha	fodtb;fodsm;vscap;vsc;vsfs	Co
<i>Euphractus sexcinctus</i>	tatu-peludo, tatu-peba		
família Myrmecophagidae			
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	fodtb; fodsm	Pc/Vu ¹ Rb ² /Ae
Família Phyllostomidae			
<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego	fodsm	
<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego	fod	
<i>Chiroderma dorie</i>	morcego		
<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego	fod	
<i>Mimonbennettii</i> sp.	morcego		
<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	morcego	fodsm	
<i>Sturnira liliu</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fodtb; fodsm	
<i>Sturnira tildae</i>	morcego		
<i>Tonatia bidens</i>	morcego		
Família Vespertilionidae			
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego		
<i>Histiotus venaticus</i>	morcego		
<i>Lasiurus borealis</i>	morcego		
<i>Myotis nigricans</i>	morcego		
<i>Myotis</i> SP.	morcego	fodsm	
Família Emballonuridae			
<i>Peropteryx macrotis</i> (Wagner, 1843)	morcego	fod	
Família Molossidae			
<i>Molossus molossus</i> (PALLAS, 1766)	morcego	fodsm	
<i>Tadarida brasiliensis</i>	morcego		
Família Noctilionidae			
<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador	fodtb; ma	
família Delphinidae			

<i>Sotalia fluviatilis</i> (Gervais & Deville, 1853)	tucuxi	aq	Co
<i>Tursiops truncatus</i>	golfinho-roaz		
família Cebidae			
<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	macaco-prego	fodtb; fodsm	Co/nc
família Atelidae			
<i>Alouatta guariba</i> (Linnaeus, 1766)	guariba, bugio	fodsm	Pc/nc
família Canidae			
<i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)	cachorro-vinagre	fodtb; fodsm	
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato, graxaim	fod;vscap;vsdp;vsc; vsfs; ma	Pc/nc
família Felidae			
<i>Leopardus guttulus?</i>	gato-do-mato-pequeno		
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaritica	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Pc/Vu ¹
<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato-pequeno	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	gato-maracajá	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Ra/Vu ¹
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	onça-pintada, onça-preta	fod; vs	Ra/Vu ¹ Rb ² /In/Ae
<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	jaguarundi	fodtb; ma fodsm; vsc; vsfs	Ra/Vu ¹
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	onça-parda, suçuarana, puma	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Co/Rb ² /Ae
família Mustelidae			
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	fodtb	Pc/Di ² /In/Ae
<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Pc
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara	fodtb; fodsm	
família Procyonidae			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Procyon cancrivorus</i> (F. Cuvier, 1798)	mão-pelada	fodtb; ma	Pc
família Tapiridae			
<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	fodtb; fodsm	Co/Vu ² /In/Ae
família Tayassuidae			
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto	fodtb;fodsm; vsdp; vsc; vsfs;	Co/Rb ² /Ae
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	queixada	fodtb;fodsm; vsdp; vsc; vsfs;	Co/nc/In/Ae
família Cervidae			
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro		
<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer, 1814)	veado	fodtb;fodsm; vsdp; vsc; vsfs;	
<i>Mazama bororo</i> Duarte, 1996	veado-bororó	fodtb;fodsm; vsdp; vsc; vsfs;	
<i>Mazama nana</i>	veado mão-curta		
família Leporidae			
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Co/Vu ² /In/Ae
<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	lebre européia	fod; vs	exótica
família Sciuridae			
<i>Guerlinguetus ingrami</i>	serelepe, caxinguelê		
<i>Sciurus aestuans</i> (Linnaeus, 1766)	serelepe	fodtb; vsc; vsfs	Co/Nc
família Hydrochaeridae			
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	fodtb	Co
família Dasyproctidae			
<i>Dasyprocta azarae</i> Lichtenstein, 1823	cutia	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Co/Di ²
família Cuniculidae			
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Co
família Caviidae			
<i>Cavia aperea</i> Erxleben, 1777	preá	fodtb;	Pc/nc
família Cricetidae			
<i>Akodon</i> spp.	rato-silvestre	fod; vs	
<i>Akodon cursor</i>	rato-silvestre		
<i>Akodon montensis</i>	rato-silvestre		

<i>Delomys dorsalis</i>	rato-silvestre	
<i>Delomys sublineatus</i>	rato-silvestre	
<i>Oryzomys</i> spp.	rato-silvestre	fod; vs
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	rato-silvestre	
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	rato-silvestre	
<i>Oxymycterus dasythricus</i>	rato-silvestre	
<i>Oxymycterus judex</i>	rato-silvestre	
<i>Thaptomys nigrita</i>	rato-silvestre	

família Echimyidae

Kannabateomys amblyonyx rato-de-taquara

Legenda para ambientes: **fod** = floresta ombrófila densa; **fodtb** = floresta ombrófila densa de terras baixas; **fodsm** = floresta ombrófila densa submontana; **vs** = vegetação secundária; **vsfs** = vegetação secundária - floresta secundária; **vsc** = vegetação secundária – capoeirão; **vscp** = vegetação secundária – capoeira; **ma** = manguezal; **fpif** = formação pioneira de influência fluvial; **aa** - áreas alteradas; **aq** – ambientes aquáticos.

Legenda para status: Local: Co – comum; Pc – pouco comum; Ra – raro. Ameaça: Am - ameaçado de extinção; Vu – vulnerável; Qa - quase ameaçada; Rb - risco baixo; Di - dados insuficientes; nc - não consta em lista oficiais; ? – status a confirmar (táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência e/ou status). Indicação: In - espécie indicadora; Ae - animal especial. Para definição do status os autores basearam-se em observações pessoais e nas seguintes referências: ¹Ministério do Meio Ambiente (2008) e ²IUCN (2008).