



ANEXO 8

FAUNA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA

Tabela 1. Macroinvertebrados bentônicos da Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa. Baseado em Calluf (2003).

| TÁXONS | NOME COMUM |
|---|--------------------------|
| Crustaceae | |
| Família Atyidae | |
| <i>Potimirim potimirim</i> (Müller, 1881) | camarão-de-água-doce |
| Família Diogenidae | |
| <i>Não identificado</i> | paguro ou ermitão |
| Família Grapsidae | |
| <i>Goniopsis cruentata</i> (Latreille, 1803) | maria-mulata |
| <i>Aratus pisonii</i> (H. Milne Edwards, 1837) | caranguejo-arborícola |
| <i>Sesarma rectum</i> Randall, 1840 | --- |
| Família Ocypodidae | |
| <i>Uca</i> sp. | chama-maré |
| <i>Ucides cordatus</i> (Linnaeus, 1763) | caranguejo-uçá |
| Família Palaemonidae | |
| <i>Macrobrachium acanthurus</i> (Wiegmann, 1836) | camarão-de-água-doce |
| <i>Macrobrachium olfersi</i> (Wiegmann, 1836) | camarão-de-água-doce |
| <i>Macrobrachium potiuna</i> (Müller, 1880) | camarão-de-água-doce |
| Família Portunidae | |
| <i>Callinectes</i> sp. | siri-azul |
| Família Penaeidae | |
| <i>Farfantepenaeus</i> sp. | camarão-rosa ou vermelho |
| <i>Litopenaeus schmitii</i> Burkenroad, 1936 | camarão-branco |
| Família Trichodactylidae | |
| <i>Trichodactylus fluviatilis</i> (Latreille, 1828) | caranguejo-de-água-doce |
| Família Xanthidae | |
| <i>Eurytium limosum</i> (Say, 1818) | --- |
| Mollusca | |
| Gastropoda, Pulmonata | --- |
| Mytilidae | sururu |
| Teredinidae | teredo |
| Insecta | |
| Anisoptera | náiades |
| Coleoptera, Gyrinidae | --- |
| Coleoptera, Hydroscaphidae | besouro mãe-d'água |
| Hemiptera, Belostomatidae | barata-d'água |
| Hemiptera, Naucoridae | --- |
| Hemiptera, Notonectidae | --- |
| Hemiptera, Nepidae | --- |
| Megaloptera | náiades |
| Plecoptera | --- |
| Zygoptera | náiades |

Tabela 2. Ictiofauna da Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa.
Baseado parcialmente em Abilhôa e Duboc (2003).

| TÁXONS | NOME COMUM |
|---|--|
| Familia Achiridae | |
| <i>Trinectes paulistanus</i> (Miranda-Ribeiro, 1915) | linguado-de-água-doce |
| Familia Ariidae | |
| <i>Genidens genidens</i> (Cuvier, 1829) | bagre-do-natal, bagre-mandi, bagre-branco |
| Familia Atherinopsidae | |
| <i>Atherinella brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | charuto, joão-duto, manjuba, manjuba-verde |
| Familia Callichthyidae | |
| <i>Callichthys</i> sp. | --- |
| <i>Corydoras barbatus</i> (Quoy & Gaimard, 1824) | coridora-barbudo |
| Familia Centropomidae | |
| <i>Centropomus parallelus</i> (Poey, 1860) | robalo |
| Familia Characidae | |
| <i>Astyanax lambaris</i> | --- |
| <i>Bryconamericus pequiras</i> | |
| <i>Characidium canivetes</i> | |
| <i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> (Ellis, 1911) | tetra-amarelo |
| <i>Hyphessobrycon griemi</i> (Hoedeman, 1957) | lambarizinho |
| <i>Hyphessobrycon luetkeni</i> (Boulenger, 1887) | lambarizinho |
| <i>Hyphessobrycon reticulatus</i> (Ellis, 1911) | lambari-prata |
| <i>Mimagoniates microlepis</i> (Steindachner, 1876) | --- |
| <i>Oligosarcus hepsetus</i> (Cuvier, 1817) | dentudo, saicanga |
| Familia Cichlidae | |
| <i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824) | cará |
| <i>Cichlasoma facetum</i> (Jenyns, 1842) | acará-camaleão |
| <i>Crenicichla</i> sp. | --- |
| <i>Tilapia rendalli</i> (Boulenger, 1896) | tilápia |
| Familia Crenuchidae | |
| <i>Characidium lanei</i> (Travassos, 1967) | charutinho |
| Familia Curimatidae | |
| <i>Cyphocharax santacatarinae</i> (Fernández-Yépez, 1948) | peixe-duro, roncador, saguairu |
| Familia Cynoglossidae | |
| <i>Symphurus plagusia</i> (Bloch & Schneider, 1801) | língua-de-mulata |
| Familia Engraulidae | |
| <i>Cetengraulis edentulus</i> (Cuvier, 1829) | arenque |
| Familia Erythrinidae | |
| <i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794) | traíra, taraíra, tararira |
| Familia Gerreidae | |
| <i>Diapterus rhombeus</i> (Cuvier, 1829) | caitipa-mojarra |
| Familia Gobiidae | |
| <i>Bathygobius soporator</i> (Valenciennes, 1837) | amboré, aimoré |
| <i>Bathygobius</i> sp. | --- |
| <i>Ctenogobius shufeldti</i> (Jordan & Eigenmann, 1887) | gobi-de-água-doce |
| <i>Ctenogobius boleosoma</i> (Gilbert & Jordan 1882) | --- |

| | |
|--|---|
| Familia Gymnotidae | |
| <i>Gymnotus carapo</i> (L., 1758) | tuvira |
| Familia Heptapteridae | |
| <i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824) | bagre, jundiá, jandiá |
| <i>Pimelodella</i> sp. | bagre |
| <i>Trichomycterus</i> sp. | bagre |
| Familia Loricariidae | |
| <i>Hypostomus</i> sp. | --- |
| <i>Microlepidogaster leucofrenatus</i> (Ribeiro, 1908) | --- |
| <i>Pseudotothyris obtusa</i> (Ribeiro, 1911) | casquidinho |
| <i>Pseudotothyris</i> sp. | --- |
| <i>Rineloricaria</i> sp. | --- |
| Familia Mugilidae | |
| <i>Mugil curema</i> (Valenciennes, 1836) | parati, parati-olho-de-fogo, paratibu, solé |
| Familia Poeciliidae | |
| <i>Phalloceros</i> sp1 | --- |
| <i>Phalloceros</i> sp2 | --- |
| <i>Poecilia vivipara</i> (Bloch & Schneider, 1801) | barrigudinho, guaru |
| Familia Sciaenidae | |
| <i>Cynoscion leiarchus</i> (Cuvier, 1830) | pescada-branca |
| Familia Symbranchidae | |
| <i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795) | muçum, peixe-cobra, enguia-de-água-doce |
| Familia Rivulidae | |
| <i>Rivulus</i> sp1 | --- |
| <i>Rivulus</i> sp2 | --- |
| Familia Tetraodonterinae | |
| <i>Deuterodon langei</i> Travassos, 1957 | lambari |

Tabela 3. Anurofauna da Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa. Baseado parcialmente em Segalla (2003) e Marques (2017).

Legenda - Ambientes flo: floresta; **aab:** áreas abertas; **aqu:** aquático; **fos:** fossorial; **ter:** terrícola; **arb:** arborícola

| TÁXONS ANUROFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTES | STATUS |
|--|----------------|-----------------|------------|
| Família Bufonidae | | | |
| <i>Rhinella crucifer</i> (Wied-Neuwied, 1821) | sapo | flo aab ter aqu | |
| Família Centrolenidae | | | |
| <i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924) | rã-de-vidro | flo arb aqu | vulnerável |
| Família Hylidae | | | |
| <i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962) | perereca | flo aab arb aqu | |
| <i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824) | perereca | flo aab arb aqu | |
| <i>Dendropsophus werneri</i> (Cochran, 1952) | perereca | flo arb aqu | |
| <i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824) | perereca | flo arb aqu | |
| <i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821) | perereca | flo aab arb aqu | |
| <i>Hypsiboas semilineatus</i> (Spix, 1824) | perereca | flo arb aqu | |
| <i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841) | perereca | flo arb aqu | vulnerável |
| <i>Phyllomedusa distincta</i> (A. Lutz in B. Lutz, 1950) | perereca-verde | flo arb aqu | |
| <i>Pseudis minuta</i> (Günther, 1858) | perereca | flo aab arb aqu | |

| TÁXONS ANUROFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTES | STATUS |
|---|--------------|-----------------|------------|
| <i>Scinax aff. alter</i> | perereca | flo aqu | |
| <i>Scinax aff. Cuspidatus</i> | perereca | flo aab arb aqu | |
| <i>Scinax argyreornatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1926) | perereca | flo arb aqu | |
| <i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925) | perereca | flo arb aqu | |
| <i>Scinax perereca</i> Pombal (Haddad & Kasahara, 1995) | perereca | flo aab arb aqu | |
| <i>Trachycephalus mesophaeus</i> (Hensel, 1867) | perereca | flo arb aqu | |
| Família Leiuperidae | | | |
| <i>Physalaemus spiniger</i> (Miranda-Ribeiro, 1926) | rãzinha | flo aab ter aqu | |
| <i>Physalaemus aff. Marmorata</i> | rãzinha | flo aab ter aqu | |
| Família Leptodactylidae | | | |
| <i>Leptodactylus latrans (=ocellatus)</i> (Steffen, 1815) | rã | flo ter aqu | |
| <i>Leptodactylus notoaktites</i> (Heyer, 1978) | rã | flo ter aqu | |
| Família Hylodidae | | | |
| <i>Hylodes heyeri</i> (Haddad, Pombal & Bastos, 1996) | --- | flo ter arb aqu | vulnerável |
| <i>Hylodes gr. nasus</i> | --- | flo ter arb aqu | vulnerável |
| Família Craugastoridae | | | |
| <i>Eleutherodactylus binotatus</i> (Spix, 1824) | rã-das-matas | flo arb aqu | vulnerável |
| Família Ceratophryidae | | | |
| <i>Ceratophrys aurita</i> (Raddi, 1823) | sapo-untanha | flo ter aqu | vulnerável |
| Família Cycloramphidae | | | |
| <i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825) | sapo | flo ter aqu | |
| Família Microhylidae | | | |
| <i>Elachistocleis ovalis</i> (Schneider, 1799) | sapinho | aab ter fos aqu | |

Tabela 4. Reptilofauna da Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa. Baseado parcialmente em Morato (2003).

Legenda: Ambientes - fl: florestas; re: restingas; mn: mangues; ab: áreas abertas; aq: aquático, sendo (It): lótico; (In): lântico; (ma): marinho; **hábitos**: fo: fossorial; sf: semifossorial; ter: terrícola; aq: aquático *sensu stricto*; saq: semi-aquático; sab: semi-arborícola; ab: arborícola. **Status** - fr: frequente; pfr: pouco frequente; rr: raro; am: ameaçado de extinção; in: insuficientemente conhecido.

| TÁXONS REPTILIOFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTES | STATUS |
|---|-------------------------|----------------|--------|
| TESTUDINES | | | |
| Família Chelidae | | | |
| <i>Hydromedusa tectifera</i> (Cope, 1869) | cágado-pescoço-de-cobra | aq (It) | fr |
| Família Cheloniidae | | | |
| <i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758) | tartaruga-cabeçuda | aq (ma) | am |
| <i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758) | tartaruga-verde | aq (ma) | am |
| CROCODYLIA | | | |
| Família Alligatoridae | | | |
| <i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802) | jacaré-de-papo-amarelo | aq (In, ma) mn | fr am |
| SQUAMATA – LACERTILIA | | | |
| Família Gekkonidae | | | |

| TÁXONS REPTILIOFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTES | STATUS |
|---|----------------------|--------------------------------|--------|
| <i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818) | lagartixa-de-parede | fl re ab | fr |
| Família Anguidae | | | |
| <i>Diploglossus fasciatus</i> (Gray, 1831) | lagarto-coral | fl | pfr |
| <i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820) | cobra-de-vidro | fl re ab | fr |
| Família Gymnophthalmidae | | | |
| <i>Placosoma glabellum</i> (Peters, 1870) | lagarto | fl re ab | fr |
| Família Teiidae | | | |
| <i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839) | lagarto, teiú | fl re mn ab | fr |
| SQUAMATA - AMPHISBAENIA | | | |
| Família Amphisbaenidae | | | |
| <i>Amphisbaena microcephala</i> (Wagler, 1824) | cobra-cega | fl re ab | fr |
| SQUAMATA - SERPENTES | | | |
| Família Colubridae | | | |
| <i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758) | cobra-cipó, voadeira | fl re ab | fr |
| <i>Chironius laevicollis</i> (Dixon, Wiest & Cei, 1993) | cobra-cipó, voadeira | fl ab | fr |
| <i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758) | caninana | fl re | fr |
| Família Dipsadidae | | | |
| <i>Clelia bicolor</i> (Peracca, 1904) | muçurana | fl | rr am |
| <i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820) | muçurana, bairú | fl | rr am |
| <i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766) | coral-falsa | fl re ab | fr |
| <i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1825) | cobra-d'água | aq (lt, ln) | fr |
| <i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758) | dormideira | fl | rr |
| <i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758) | cobra-d'água | fl re mn ab aq (lt, ln, ma) | fr |
| <i>Oxyrhopus clathratus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) | coral-falsa | fl re | fr |
| <i>Sibynomorphus newwiedi</i> (Ihering, 1911) | dormideira | fl re ab | fr |
| <i>Uromacerina ricardinii</i> (Peracca, 1897) | cobra-cipó | fl re | pfr |
| <i>Xenodon newwiedi</i> (Günther, 1863) | jararaca-falsa | fl | fr |
| Família Elapidae | | | |
| <i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820) | coral-verdadeira | fl re ab | fr |
| Família Viperidae | | | |
| <i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1924) | jararaca | fl re ab | fr |
| <i>Bothrops jararacussu</i> (Lacerda, 1884) | jararacuçu | fl re ab | fr |

Tabela 5. Avifauna da Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa.

Legenda: Ambiente – **fpfm:** formações pioneiras de influência fluviomarina; **fpf:** formações pioneiras de influência fluvial; **fod:** floresta ombrófila densa primária; **pa:** pastagem; **ca:** capoeira (fase inicial de floresta); **cp:** capoeirão (fase intermediária de floresta); **fs:** floresta secundária; **aa:** áreas alteradas; **aq:** ambientes aquáticos. **Status – Am:** ameaçada de extinção; **Ra:** rara; **Vu:** vulnerável; **Exo:** exótica; **Ic:** insuficientemente conhecida e possivelmente ameaçada; **Bi:** indicadora de integridade ambiental, para ambientes florestais; **M:** migratória; **Em:** endêmica; **?:** táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência [com base em IBAMA (2003); SICK (1997); BIRDLIFE (2000)]

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|-----------------|------------|----------|--------|
|-----------------|------------|----------|--------|

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|-----------------------|-----------------|--------|
| ANSERIFORMES | | | |
| Família Anatidae | | | |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789) | ananaí | fpfm-fpf | |
| <i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758) | pato-do-mato | fpfm-fpf | |
| GALLIFORMES | | | |
| Família Cracidae | | | |
| <i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825) | aracuã | fpfm-fod | |
| <i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815) | jacu | fod-cp-fs | Am |
| <i>Penelope superciliaris</i> (Temminck, 1815) | jacupemba | fod-cp-sc | |
| <i>Pipile jacutinga</i> (Spix, 1825) | jacutinga | fod | Am, Bi |
| Família Odontophoridae | | | |
| <i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825) | uru | fod | |
| SULIFORMES | | | |
| Família Fregatidae | | | |
| <i>Fregata magnificens</i> (Mathews, 1914) | fragata | aq | |
| Família Sulidae | | | |
| <i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783) | atobá | aq | |
| Família Phalacrocoracidae | | | |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789) | biguá | fpf-aq | |
| PELECANIFORMES | | | |
| Família Threskiornithidae | | | |
| <i>Platalea ajaja</i> (Linnaeus, 1758) | colhereiro | fpfm-fpf | |
| Família Ardeidae | | | |
| <i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766) | socó-grande | fpfm-fpf | |
| <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | garça-vaqueira | pa | |
| <i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758) | socozinho | fpfm-fpf | |
| <i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758) | garça-branca-grande | | |
| <i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | garça-azul | fpfm-fpf | |
| <i>Egretta thula</i> (Molina, 1782) | garça-branca-pequena | fpfm-fpf | |
| <i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758) | savacu-de-coroa | fpfm-fpf | Ra |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> (Gmelin, 1789) | savacu | fpfm-fpf | |
| <i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783) | garça-real | fpfm-fpf | |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824) | maria-faceira | fpfm-fpf | |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783) | socó-boi | fpfm-fpf | |
| <i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823) | socó-amarelo | fpfm-fpf | |
| ACCIPITRIFORMES | | | |
| Família Accipitridae | | | |
| <i>Accipter poliogaster</i> (Temminck, 1824) | tautó-pintado | fod | |
| <i>Accipter striatus</i> (Vieillot, 1808) | gaviãozinho-miúdo | fod | |
| <i>Buteo albicaudatus</i> (Vieillot, 1816) | gavião-de-rabo-branco | fod | |
| <i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788) | gavião-caboclo | fpfm-fpf | Ra |
| <i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758) | gavião-tesoura | fod-sc | |
| <i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818) | gavião-peneira | fod-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823) | gavião-bombachinha | fod | |
| <i>Leucopternis lacernulata</i> (Temminck, 1827) | gavião-pombo-pequeno | fod | Am, Vu |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|--------------------------------|-----------------|--------|
| <i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847) | gavião-pombo-grande | fod-ca-cp-fs-aa | Am |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817) | gavião-caramujeiro | fpfm-fpf | |
| <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788) | gavião-carijó | fod-ca-cp-fs-aa | |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816) | gavião-pato | fod | |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820) | gavião-pega-macaco | fod | Ra, Bi |
| <i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788) | gavião-preto | fpf-aq | |
| GRUIFORMES | | | |
| Família Rallidae | | | |
| <i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847) | saracurinha-da-mata | fpfm-fpf | |
| <i>Aramides cajanea</i> (Müller, 1776) | saracura-três-potes | fpfm-fpf | |
| <i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825) | saracura-do-mato | fpf-fod-sc | |
| <i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831) | pinto-d'água | fpfm-fpf | |
| <i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819) | pinto-d'água-comum | fpfm-fpf | |
| <i>Porphyryla martinica</i> (Linnaeus, 1766) | frango-d'água-azul | fpfm-fpf | |
| <i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819) | sanã-carijó | fpfm-fpf | |
| <i>Rallus nigricans</i> Vieillot, 1819 | saracura-sanã | fpfm-fpf | |
| CHARADRIIFORMES | | | |
| Família Charadriidae | | | |
| <i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818) | batuíra-de-coleira | fpfm-fpf-aq | |
| <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782) | quero-quero | fpf | |
| Família Scolopacidae | | | |
| <i>Actitis macularia</i> (Linnaeus, 1766) | maçarico-pintado | fpfm | |
| <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | maçarico-de-papo-vermelho | fpfm | |
| <i>Gallinago paraguayae</i> (Vieillot, 1816) | narceja | fpf | |
| Família Jacanidae | | | |
| <i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766) | jaçanã | fpfm-fpf | |
| Família Jacanidae | | | |
| <i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823) | gaivota-maria-velha | aq | |
| <i>Larus dominicanus</i> (Lichtenstein, 1823) | gaivotão | aq | |
| <i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789) | trinta-réis-de-bico-amarelo | aq | |
| <i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783) | trinta-réis-real | aq | |
| APODIFORMES | | | |
| Família Apodidae | | | |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> (Sclater, 1862) | taperá-de-barriga-cinza | fod-ca-cp-fs-aa | |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796) | taperuçu-de-coleira-branca | fod-ca-cp-sc-aa | |
| Família Trochilidae | | | |
| <i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-de-banda-branca | fpf-fod-cp-fs | |
| <i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817) | beija-flor-de-veste-preta | fod-cp | |
| <i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-cinza | fpf-fod-sc-cp | |
| <i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783) | beija-flor-rubi | fod | |
| <i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832) | rabo-branco-de-garganta-rajada | fod-fs-cp | |
| <i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839) | rabo-branco-acanelado | fod-sc-cp | |
| <i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818) | beija-flor-grande-da-mata | fod-sc-cp | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|------------------------------|--------------------|--------|
| <i>Thalurania glaucopsis</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-de-fronte-violeta | fpfm-fpf-fod-cp-fs | |
| CORACIIFORMES | | | |
| Família Alcedinidae | | | |
| <i>Ceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766) | martim-pescador-grande | fpfm-fpf | |
| <i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790) | martim-pescador-verde | fpfm-fpf | |
| <i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788) | martim-pescador-pequeno | fpfm-fpf | |
| <i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766) | martim-pescador-da-mata | fpfm-fpf | |
| Família Momotidae | | | |
| <i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818) | juruva-verde | fod-sc | |
| GALBULIFORMES | | | |
| Família Bucconidae | | | |
| <i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824) | joão-bobo | fod-sc | |
| PICIFORMES | | | |
| Família Ramphastidae | | | |
| <i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819) | araçari-banana | fod-sc | Am |
| <i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766 | tucano-de-bico-verde | fod-sc | |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> (Lichtenstein, 1823) | tucano-de-bico-preto | fod-fs | Ra |
| <i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823) | araçari-poca | fod-sc | |
| Família Picidae | | | |
| <i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1819) | pica-pau-rei | fod | Am |
| <i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788) | pica-pau-velho | fod-cp-sc | |
| <i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818) | pica-pau-do-campo | pa-ca-aa | |
| <i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788) | pica-pau-verde-barrado | fod-cp-sc | |
| <i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) | pica-pau-da-banda-branca | fod-fs | |
| <i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796) | pica-pau-branco | fod-sc | |
| <i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818) | benedito | fod-fs | |
| <i>Picus flavigula</i> (Boddaert, 1783) | pica-pau-bufador | fpfm-fpf | |
| <i>Picumnus temminckii</i> (Lafresnaye, 1845) | picapauzinho | fod-cp-fs | |
| <i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827) | pica-pauzinho-carijó | fod-cp-sc | |
| FALCONIFORMES | | | |
| Família Falconidae | | | |
| <i>Falco rufigularis</i> (Daudin, 1800) | falcão-caruê | fod | |
| <i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817) | falcão-caburé | fod | |
| <i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816) | gavião-carrapateiro | fod-ca-cp-fs-aa | |
| <i>Polyborus plancus</i> (Miller, 1777) | caracará | fod-ca-cp-sc-aa | |
| PSITTACIFORMES | | | |
| Família Psittacidae | | | |
| <i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758) | papagaio-de-cara-roxa | fpfm-fod-sc | |
| <i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820) | papagaio-de-peito-roxo | fod | Am |
| <i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788) | periquito | fod-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Forpus xanthopterygius</i> (Taczanowski, 1883) | tuim-de-asa-azul | fod-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769) | cuiu-cuiu | fod-sc | Ra, Bi |
| <i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820) | maitaca-verde | fod-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818) | tiriva-de-testa-vermelha | fod-sc | |
| PASSERIFORMES | | | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|-----------------------------|--------------|--------|
| Família Thamnophilidae | | | |
| <i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819) | matracão | fod-sc | Bi |
| <i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822) | dituí | fod | |
| <i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825) | trovoada-carijó | fod | Bi |
| <i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906) | trovoada-ocre | fod | |
| <i>Dryophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823) | pintadinho | fod | |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823) | choquinha-lisa | fod-sc-cp | |
| <i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823) | choquinha-de-peito-pintado | fod-sc | |
| <i>Herpsilochmus rufomarginatus</i> (Temminck, 1822) | chorozinho-de-asa-ruiva | fod | Bi |
| <i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816) | chocão-carijó | fod | Bi |
| <i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823) | borralhara-preta | fod | Bi |
| <i>Myrmeciza squamosa</i> (Pelzeln, 1868) | formigueiro-da-grota | fod | |
| <i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825) | choquinha-estrelada | fod | |
| <i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétrières, 1835) | choquinha-cinzenta | fod | |
| <i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818) | papa-taoca-do-sul | fod-sc-cp | |
| <i>Stymphalornis acutirostris</i> (Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995) | bicudinho-do-brejo | fpfm-fpf | |
| <i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831) | zidedê-do-sul | fod | |
| <i>Thamnophilus caeruleus</i> (Vieillot, 1816) | choca-da-mata | fod-sc-cp-ca | |
| <i>Thamnophilus ruficapillus</i> (Vieillot, 1816) | choca-de-chapéu-vermelho | fod-sc-cp | |
| Família Conopophagidae | | | |
| <i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831) | chupa-dente-marrom | fod-fs-cp-ca | |
| <i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818) | chupa-dente-de-mascara | fod | |
| Família Rhinocryptidae | | | |
| <i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétrières, 1835) | tapaculo-pintado | Fod | |
| <i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831) | macuquinho-perereca | | Bi |
| Família Dendrocolaptidae | | | |
| <i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1823) | arapaçu-alfange | Fod | Bi |
| <i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820) | arapaçu-pardo | fod-sc | Bi |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (Spix, 1824) | arapaçu-grande | fod-sc | Bi |
| <i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859) | arapaçu-escamoso | fod-sc | |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-de-cabeça-cinza | fod-cp-sc | |
| <i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-de-garganta-branca | Fod | |
| <i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-rajado | fod-sc | Bi |
| Família Furnariidae | | | |
| <i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816) | limpa-folhas-de-coleira | fod | |
| <i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821) | barranqueiro-de-olho-branco | fod-sc | |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788) | curutié | fpfm-fpf | |
| <i>Cichocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830) | trepador-de-sobrancelhas | fod-sc-cp | |
| <i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853) | joão-oliváceo | cp-sc | |
| <i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788) | joão-de-barro | ca-cp-pa-aa | |
| <i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885 | bico-virado-do-sul | fod-sc | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|---|-------------------------------|-----------------|--------|
| <i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823) | joão-porca | Fod | |
| <i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821) | limpa-folha-coroado | fod-sc | |
| <i>Philydor lichtensteini</i> (Cabanis & Heine, 1859) | limpa-folha | fod-sc | |
| <i>Philydor rufus</i> (Vieillot, 1818) | limpa-folha-de-testa-canela | fod-sc | |
| <i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835) | vira-folhas | fod-sc | |
| <i>Synallaxis cinerascens</i> (Temminck, 1823) | pi-pui | fod-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819) | pichororé | fod-ca-cp-sc | |
| <i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856) | joão-tenenem | fod-ca-cp | |
| <i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788) | bico-virado-miudo | fod-sc | |
| <i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821 | bico-virado-carijó | fod-sc | |
| Família Pipridae | | | |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793) | tangará-dançarino | fod-fs-cp-ca | |
| <i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766) | rendeira-branca | fod-sc-cp | Bi |
| <i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831) | flautim-verde | fod-sc | |
| Família Oxyruncidae | | | |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821) | bico-agudo | fod | Bi |
| Família Cotingidae | | | |
| <i>Carpornis cuculatus</i> (Swainson, 1821) | corocochó | fod | Bi |
| <i>Carpornis melanocephalus</i> (Wied, 1820) | sabiá-pimenta | fod | |
| <i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844) | tropeiro-da-serra | fod | |
| <i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817) | araponga | fod | Vu |
| <i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792) | pavó | fod-sc | Am, Bi |
| Família Tyrannidae | | | |
| <i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819) | tinguaçu | fod | |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824) | risadinha | cp-ca | |
| <i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831) | guaracavuçu-quieto | fod-sc | |
| <i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818) | maria-viuvinha | fod-sc-cp-ca | |
| <i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822) | guaracava-de-barriga-amarela | fod-sc-cp-ca | |
| <i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | guaracava-de-óculos | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzeln, 1868) | guaracava-verde | fod-sc-cp-ca | |
| <i>Elaenia spectabilis</i> (Pelzeln, 1868) | guaracava-grande | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818) | peitica | cp-ca | |
| <i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766) | lavadeira-mascarada | fpf-fpfm | |
| <i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831) | tachuri-campainha | fop-sc-cp | |
| <i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831) | tiririsinho-de-óculos | fod | |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868) | enferrujado | fod-sc | |
| <i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818) | bem-te-vi-pirata | fod-sc-cp | |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846) | cabeçudo | fod-sc | |
| <i>Machetornis rixosus</i> (Vieillot, 1819) | suiriri-cavaleiro | pa-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766) | nei-nei | fod-sc-cp-ca-pa | |
| <i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846) | abre-asa-de-cabeça-cinza | fod-sc | |
| <i>Myiobius atricaudus</i> (Lawrence, 1863) | papa-mosca-espoleta | fod-sc | |
| <i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) | assanhadinho-de-peito-dourado | fod-sc | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| <i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776) | bem-te-vi-rajado | fod-sc-cp | |
| <i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835) | maria-da-copa | cp-ca | |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> (Müller, 1776) | felipe-de-peito-riscado | pa-ca-cp | |
| <i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818) | miudinho | fop-sc-cp | |
| <i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825) | bem-te-vi-de-coroa-vermelha | fod-sc-cp-ca-pa | |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818) | caneleiro-preto | fod-sc-cp | |
| <i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822) | piolhinho | fod | |
| <i>Phylloscartes kronei</i> (Willis & Oniki, 1992) | maria-da-restinga | fod | |
| <i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887) | cara-pintada | fod | |
| <i>Phylloscartes paulistus</i> (Ihering & Ihering, 1907) | não-pode-parar | fod | |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766) | bem-te-vi-verdadeiro | fod-sc-cp-ca-pa | |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818) | patinho-de-garganta-branca | fod-sc | |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783) | príncipe | ca-cp-pa-aa | |
| <i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818) | suiriri-pequeno | pa-ca-cp-sc-aa | |
| <i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817) | joão-pobre | cp | |
| <i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817) | alegrinho-do-leste | cp | |
| <i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) | maria-assobiadeira | fod-sc-cp | |
| <i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) | araponguinha-de-rabo-preto | fod-sc-cp | |
| <i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831) | spit-spit | fod | |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825) | bico-chato-de-orelha-preta | fod | |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819) | suiriri-tropical | cp-ca-pa-aa | |
| <i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808) | tesoura | ca-pa-aa | M |
| Família Vireonidae | | | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789) | pitiguari | fod-fs-cp-ca-aa | |
| <i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822) | verdinho-coroado | fod-sc-cp-ca | |
| <i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817) | juruvicara | fod-sc-cp-ca-aa | |
| Família Corvidae | | | |
| <i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818) | gralha-azul | fod-fs-cp | |
| Família Hirundinidae | | | |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-pequena-de-casa | fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa | |
| <i>Phaeoprogne tapera</i> (Linnaeus, 1766) | andorinha-do-campo | fpf-fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789) | andorinha-grande | fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa | |
| <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | andorinha-do-barranco | fpf-ca-pa-aa | |
| Família Troglodytidae | | | |
| <i>Thryothorus longirostris</i> (Vieillot, 1819) | garrinchão-de-bico-grande | fpfm-fpf | |
| <i>Troglodytes aedon</i> (Vieillot, 1808) | corruíra | cp-ca-pa-aa | |
| Família Polioptilidae | | | |
| <i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819 | bico-assovelado | fod-sc-cp | Vu |
| Família Parulidae | | | |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> (Liechtenstein, 1830) | pula-pula-coroado | fod-sc-cp | |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789) | pia-cobra | fpfm-fpf-fod-cp-ca | |
| <i>Parula pitayumi</i> (Vieillot, 1817) | mariquita-do-sul | fod-sc-cp | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|
| <i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821) | pula-pula-ribeirinho | fpf-fod | |
| Família Icteridae | | | |
| <i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782) | sargento | fpfm-fpf-ca | |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) | guaxe | fpf-fod-fs-cp | |
| <i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850) | policia-inglesa-do-sul | ca-pa-aa | |
| <i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789) | chopim-gaudério | ca-pa-aa | |
| <i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788) | iraúna-grande | ca-pa-aa | |
| Família Thraupidae | | | |
| <i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758) | saí-verde | fod-sc-cp | |
| <i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) | saí-azul | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1776) | gaturamo-fifi | fod-sc-cp | |
| <i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801) | ferro-velho | fod | Bi |
| <i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758) | gaturamo-verdadeiro | fod-sc-cp | |
| <i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817) | tiê-da-mata | fod | Bi |
| <i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818) | saíra-da-mata | fod-sc-cp | |
| <i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839) | sanhaçu-pardo | fod | |
| <i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819) | catirumbava | fod | |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819) | saíra-viuva | fod-sc-cp | |
| <i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766) | tiê-sangue | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822) | gurundi | fod-sc-cp | |
| <i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) | tiê-galo | fod | |
| <i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776) | saira-de-lenço | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806) | saíra-sapucaia | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776) | sete-cores | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817) | sanhaço-asa-azul | fod | |
| <i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821) | sanhaço-do-coqueiro | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766) | sanhaço-cinza | fod-sc-cp-ca-aa | |
| <i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818) | tiê-de-topete | fod-sc-cp | |
| Subfamília Dacninae | | | |
| <i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811) | saí-andorinha | fod-sc-cp-ca | |
| Família Fringillidae | | | |
| <i>Carduelis magellanicus</i> (Vieillot, 1805) | pintassilgo-de-cabeça-preta | pa-ca-cp-aa | |
| Família Passeridae | | | |
| <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | pardal-doméstico | aa | Exo |
| Família Caprimulgidae | | | |
| <i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783 | joão-corta-pau | fod-sc | |
| <i>Hydropsalis brasiliana</i> (Gmelin, 1789) | curiango-tesoura | fod-ca-pa-aa | |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1788) | tuju | fod-sc | |
| <i>Macropsalis creaga</i> (Bonaparte, 1850) | curiango-tesourão | fod-cp | |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789) | curiango-comum | fod-sc | |
| <i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817) | tabaco-bom | pa-aa | |
| Família Cathartidae | | | |
| <i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758) | urubu-de-cabeça-vermelha | fod-ca-cp-fs | |
| <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793) | urubu-comum | fod-ca-cp-fs-aa | |
| Família Coerebidae | | | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|---------------------------|-----------------|--------|
| <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) | cambacica | fs-cp-ca-aa | |
| Família Columbidae | | | |
| <i>Columba plumbea</i> (Vieillot, 1818) | pomba-amargosa | fod-fs | |
| <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811) | rolinha-roxa | ca-cp-aa | |
| <i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) | juriti-piranga | fod-cp-sc | |
| <i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855) | juriti-pupu | fod-ca-cp-fs | |
| <i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792) | pavó | fod-sc | |
| Família Cuculidae | | | |
| <i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758) | anu-preto | ca-pa-aa | |
| <i>Dromococcyx pavoninus</i> (Pelzeln, 1870) | peixe-frito-pavonino | cp-ca-pa | |
| <i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788) | anu-branco | ca-pa-aa | |
| <i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) | alma-de-gato | fod-cp-fs | |
| <i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766) | saci-do-campo | cp-ca-pa | |
| Família Emberizidae | | | |
| <i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766) | curió | cp-ca-fpf | Ra, Vu |
| <i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800) | bico-pimenta | fod- | Bi |
| <i>Saltator similis</i> (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837) | trinca-ferro-de-asa-verde | fod-fs-cp | |
| <i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766) | canário-da-terra | pa-ca-cp-aa | |
| <i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766) | curió | pa-ca-cp-aa | |
| <i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1817) | coleirinha | pa-ca-cp-aa | |
| <i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869) | pichochó | fod | |
| <i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766) | tiziu | pa-ca-cp-aa | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776) | tico-tico-verdadeiro | cp-ca-pa-aa | |
| Família Formicariidae | | | |
| <i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1818) | tovaca-campainha | fod | Bi |
| <i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 | pinto-da-mata-coroado | fod | |
| <i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) | tovacuçu-malhado | fod | Bi |
| Família Muscicapidae | | | |
| Subfamília Turdinae | | | |
| <i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818) | sabiá-preta | fod | |
| <i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818) | sabiá-coleira | fod-fs-cp | |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1851) | sabiá-poca | fod-fs-cp-ca | |
| <i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818) | sabiá-laranjeira | fod-fs-cp-ca-aa | |
| Família Nyctibiidae | | | |
| <i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789) | urutau | fod-fs | |
| TINAMIFORMES | | | |
| Família Tinamidae | | | |
| <i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820) | jaó | fod | Am, Bi |
| <i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815) | inhambu-guaçu | fod-cp-fs | Bi |
| <i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819) | macuco | fod | Am, Bi |
| STRIGIFORMES | | | |
| Família Tytonidae | | | |
| <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | suindara | aa | |
| Família Strigidae | | | |
| <i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788) | caburé | fod-sc | |

| TÁXONS AVIFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|---|-------------------------------|-----------|--------|
| <i>Otus atricapillus</i> (Temminck, 1822) | corujinha-sapo | fod-sc-cp | |
| <i>Otus choliba</i> (Vieillot, 1817) | corujinha-do-mato | fod-sc-cp | |
| <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901) | murucututu-de-barriga-amarela | fod | |
| <i>Speotyto cunicularia</i> (Molina, 1782) | coruja-buraqueira | pa-aa | |
| TROGONIFORMES | | | |
| Família Trogonidae | | | |
| <i>Trogon rufus</i> (Gmelin, 1758) | surucuá-de-barriga-amarela | fod-cp-sc | |
| <i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817) | surucuá-de-peito-azul | fod-cp-fs | |
| <i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 | surucuá-dourado | fod-cp-sc | |

Tabela 6. Mastofauna da Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa.

Legenda: Ambientes – **fod**: floresta ombrófila densa; **fodtb**: floresta ombrófila densa de terras baixas; **fodsm**: floresta ombrófila densa submontana; **vs**: vegetação secundária; **vsfs**: vegetação secundária - floresta secundária; **vsc**: vegetação secundária – capoeirão; **vscp**: vegetação secundária – capoeira; **ma**: manguezal; **fpif**: formação pioneira de influência fluvial; **aa**: áreas alteradas; **aq**: ambientes aquáticos. **Status** - Local: **Co** – comum; **Pc** – pouco comum; **Ra** – raro. Ameaça: **Am** - ameaçado de extinção; **Vu** – vulnerável; **Qa** - quase ameaçada; **Rb** - risco baixo; **Di** - dados insuficientes; **nc** - não consta em lista oficiais; **?** – status a confirmar (táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência e/ou status). Indicação: **In** - espécie indicadora; **Ae** - animal especial. Para definição do status os autores basearam-se em observações pessoais e nas seguintes referências: Ministério do Meio Ambiente (2008) e IUCN (2008).

| TÁXONS MASTOFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------|
| ORDEM DIDELPHIMORPHIA | | | |
| família Didelphidae | | | |
| <i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780) | cuíca-d'água | fpif | |
| <i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840) | gambá-de-orelha-branca | fodtb; fodsm; | |
| <i>Didelphis aurita</i> (Wied-Neuwied, 1826) | gambá-de-orelha-preta | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |
| <i>Didelphis marsupialis</i> (Linnaeus, 1758) | gambá-comum | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |
| <i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842) | guaiquica | fodtb | |
| <i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817) | cuíca-de-quatro-olhos-marrom | fodtb; fodsm; fpif | |
| <i>Micoureus demerarae</i> (Thomas, 1905) | cuíca | fodtb | |
| <i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776) | cuíca-de-três-listras | fodsm | |
| <i>Philander frenatus</i> (Olfers, 1818) | cuíca-de-quatro-olhos | fodtb; fodsm; fpif | |
| família Dasypodidae | | | |
| <i>Dasyopus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758) | tatu-galinha | fodtb-fodsm-vsc ap-vsc -vsfs | Co |
| ORDEM PILOSA | | | |
| família Myrmecophagidae | | | |
| <i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758) | tamanduá-mirim | fodtb-fodsm | Pc/Vu/Rb/Ae |
| ORDEM CHIROPTERA | | | |
| Família Phyllostomidae | | | |
| <i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818) | morcego | fodsm | |
| <i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856) | morcego | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |
| <i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838) | morcego | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |

| TÁXONS MASTOFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| <i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818) | morcego | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |
| <i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821) | morcego | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |
| <i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758) | morcego | fod | |
| <i>Chiroderma dorie</i> (Thomas, 1891) | morcego | | |
| <i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856) | morcego | fodtb; fodsm | |
| <i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810) | morcego-vampiro | fodtb; vsc; vsfs | |
| <i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766) | morcego | fod | |
| <i>Micronycteris</i> sp. | morcego | fodtb | |
| <i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843) | morcego | fodsm | |
| <i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810) | morcego | fodtb; fodsm | |
| Família Vespertilionidae | | | |
| <i>Myotis</i> sp. | morcego | fodsm | |
| Família Emballonuridae | | | |
| <i>Peropteryx macrotis</i> (Wagner, 1843) | morcego | fod | |
| Família Molossidae | | | |
| <i>Cynomops abrasus</i> (Temminck, 1827) | morcego | fod | |
| <i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823) | morcego | fodsm | |
| Família Noctilionidae | | | |
| <i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758) | morcego-pescador | fodtb-ma | |
| ORDEM CETARTIODACTYLA | | | |
| Família Delphinidae | | | |
| <i>Sotalia fluviatilis</i> (Gervais & Deville, 1853) | tucuxi | aq | Co |
| ORDEM PRIMATES | | | |
| família Cebidae | | | |
| <i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758) | macaco-prego | fodtb-fodsm | Co/nc |
| família Atelidae | | | |
| <i>Alouatta guariba</i> (Linnaeus, 1766) | guariba, bugio | fodsm | Pc/nc |
| ORDEM CARNIVORA | | | |
| família Canidae | | | |
| <i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766) | cachorro-do-mato, graxaim | fod-vsc-vscp-vsc -vsfs-ma | Pc/nc |
| família Felidae | | | |
| <i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758) | jaguaririca | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | Pc/Vu |
| <i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775) | gato-do-mato-pequeno | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | |
| <i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821) | gato-maracajá | fodtb; fodsm; vsc; vsfs | Ra/Vu |
| <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (Geoffroy, 1803) | jaguarundi | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Ra/Vu |
| <i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771) | onça-parda | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Co/Rb/A e |
| família Mustelidae | | | |
| <i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818) | lontra | fodtb | Pc/Di/ In/Ae |
| <i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782) | furão | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Pc |
| família Procyonidae | | | |
| <i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766) | quati | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | |
| <i>Procyon cancrivorus</i> (Cuvier, 1798) | mão-pelada | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | |
| ORDEM ARTIODACTYLA | | | |
| família Tayassuidae | | | |
| <i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758) | cateto | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Co/Rb/A e |
| família Cervidae | | | |

| TÁXONS MASTOFAUNA | NOME COMUM | AMBIENTE | STATUS |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------|
| <i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer, 1814) | veado | fodtb;fodsm; vscp; vsc; vsfs; | |
| <i>Mazama</i> sp. | veado n.i. | fodtb-fodsm | Co/Di |
| ORDEM LAGOMORPHA | | | |
| família Leporidae | | | |
| <i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758) | tapiti | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Co/Vu/ In/Ae |
| ORDEM RODENTIA | | | |
| família Sciuridae | | | |
| <i>Sciurus aestuans</i> (Linnaeus, 1766) | serelepe | fodtb; vsc; vsfs | |
| família Hydrochaeridae | | | |
| <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766) | capivara | fodtb | Co |
| família Dasyproctidae | | | |
| <i>Dasyprocta azarae</i> (Lichtenstein, 1823) | cutia | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Co/Di |
| família Cuniculidae | | | |
| <i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766) | paca | fodtb-fodsm-vsc -vsfs | Co |
| família Caviidae | | | |
| <i>Cavia aperea</i> (Erxleben, 1777) | preá | fodtb | Pc/nc |
| família Cricetidae | | | |
| <i>Akodon</i> sp. | rato-silvestre | fod-vs | |
| <i>Euryoryzomys russatus</i> (Wagner, 1848) | rato-silvestre | fod; vs | |
| <i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827) | Rato-d'água | fpif-aq | |
| <i>Oligoryzomys</i> sp. | rato-silvestre | fod; vs | |
| <i>Oryzomys russatus</i> | rato-silvestre | fod-vs | |