

**FLORA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DA-CARA-ROXA**

Táxons	Nome comum	Hábito
<b>família Acanthaceae</b>		
<i>Aphelandra ornata</i> (Nees) Lindau	---	hb
<i>Hygrophila brasiliensis</i> (Spreng.) Lindau	---	hb
<i>Justicia carnea</i> (Lindl.) Nicholson	justícia-rosa, jacobina, bálsamo-cor-de-carne	hb
<i>Ruellia brevifolia</i> (Polh) C. Excurra	pingo-de-sangue, junta-de-cobra-vermelha	hb
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	amarelinha, cipó-africano	tp
<b>família Amaranthaceae</b>		
<i>Alternanthera maritima</i> (Mart.) A. St.-Hil.	---	hb
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	perna-de-saracura, bredo-d'água	hb
<i>Amaranthus viridis</i> L.	bredo, caruru, amaranto	hb
<b>família Anacardiaceae</b>		
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aoeira-vermelha	av
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	cupiúva	av
<b>família Annonaceae</b>		
<i>Annona emarginata</i> Schltl.	araticum, quarema	av
<i>Annona glabra</i> L.	araticum-do-brejo, corticeira	av
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	cortiça, embiú	av
<i>Rollinia sericea</i> (R.E. Fries) R.E. Fries	araticum-alvadio	av
<i>Rollinia</i> sp.	---	av
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba, cortiça, pandauvuna	av
<i>Xylopia langsdorffiana</i> A. St.-Hil. & Tul.	pimenteira	av
<b>família Apiaceae</b>		
<i>Apium leptophyllum</i> (DC.) F.Muell.	aipo-chimarrão	hb
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	erva-capitão	hb
<b>família Apocynaceae</b>		
<i>Allamanda schottii</i> L.	alamanda, alamanda-de-flo-pequena	ab
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	guatambu	av
<i>Aspidosperma pyricollum</i> Müll. Arg.	peroba-guatambu	av
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll. Arg.	guatambu	av
<i>Condylocarpon isthmicum</i> A. DC.	tênia	tp
<i>Forsteronia</i> sp.	---	tp
<i>Malouetia arborea</i> Miers	---	av
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	jasmim-cata-vento, cobrina	av
<b>família Aquifoliaceae</b>		
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	caúna	av
<i>Ilex integerrima</i> Reissek.	caúna	av
<i>Ilex pseudobuxus</i> Reissek	caúna	av
<i>Ilex</i> sp.	---	av
<i>Ilex theezans</i> Mart.	caúna	av
<b>família Araceae</b>		
<i>Anthurium pentaphyllum</i> Kunth	antúrio	ep
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	antúrio-vagabundo	ep
<i>Anthurium</i> sp.	---	ep
<i>Calladium x hortulanum</i> Birdsey	tinhorão, caládio	hb
<i>Monstera adansonii</i> Schott	costela-de-adão	ep
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	banana-de-bugre, imbé	ep
<i>Philodendron corcovadense</i> Reitz	cipó-preto	ep
<i>Philodendron cordatum</i> (Vell.) Kunth	---	ep
<i>Philodendron crassinervium</i> Lindl.	---	ep
<i>Philodendron</i> sp.	---	ep

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Pistia stratiotes</i> L.	alface-d'água, repolho d'água	hb
<b>família Araliaceae</b>		
<i>Didymopanax angustissimum</i> March.	mandioqueira	av
<i>Schefflera morototoni</i> Decne. & Planch.	caixeta	av
<i>Oreopanax capitatum</i> Decne. & Planch.	---	ep
<b>família Araucariaceae</b>		
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	araucária	av
<b>família Arecaceae</b>		
<i>Arecaceae</i> sp1	---	av
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	palmeira-brejaúva	av
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	palmeira-indaiá	av
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	av
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmeira-juçara	av
<i>Geonoma elegans</i> Mart.	---	ab
<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	guaricanga-de-folha-larga, rabo-de-peixe	ab
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricana, guaminhova	ab
<i>Syagrus romanzoffiana</i> Cham.	jerivá	av
<b>família Aristolochiaceae</b>		
<i>Aristolochia trilobata</i> Gomez	cipó-de-cobra, cipó-milhomens-da-praia	tp
<b>família Asclepiadaceae</b>		
<i>Asclepias curassavica</i> L.	oficial-de-sala	hb
<i>Matelea maritima</i> (Jacq.) Woodson	---	tp
<b>família Asteraceae</b>		
<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	carrapicho-da-praia, carrapicho-rasteiro	hb
<i>Achyrocline satureoides</i> DC.	losna-do-mato, macela	hb
<i>Adenostemma brasiliannum</i> (Pers.) Cass.	cravinho-do-mato	hb
<i>Aecmella cf. oleracea</i>	---	hb
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	mentrasto	hb
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	---	hb
<i>Baccharis cf. semiserrata</i> DC.	vassoura	ab
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassoura, vassourinha	ab
<i>Baccharis myriocephala</i> A. DC.	---	hb
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	carqueja	hb
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	buva	hb
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	erva-botão	hb
<i>Elephantopus mollis</i> H.B.K.	erva-grossa, pé-de-elefante	hb
<i>Emilia sonchifolia</i> DC.	serralhinha, falsa-serralha	hb
<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	capiçoba, caruru-amargoso	hb
<i>Eupatorium betonicaefforme</i> (DC.) Baker	---	hb
<i>Eupatorium casaretoi</i> (B. L. Rob.) Steyermark	vassoura-branca	hb
<i>Eupatorium inulaefolium</i> Sims	---	hb
<i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	mata-pasto, cambará-falso	hb
<i>Gamochaeta</i> sp.	---	hb
<i>Gochnativa polymorpha</i> (Less.) Cabr.	cambará	av
<i>Mikania involucrata</i> Hook. & Arn.	---	tp
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	---	tp
<i>Mikania trinervis</i> Hook. & Arn.	---	tp
<i>Solidago chilensis</i> Mey.	arnica-brasileira, erva-lanceta	hb
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	agrião, arnica	hb
<i>Vernonia beyrichii</i> Less.	---	hb

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Vernonia quinqueflora</i> Less.	cambarazinho	tp
<i>Vernonia scorpioides</i> (Lam.) Pers.	cambará-usso, erva-preá	hb
<b>família Begoniaceae</b>		
<i>Begonia fischeri</i> Schrank	begônia, azedinha	hb
<i>Begonia paleata</i> Schott & A. DC.	begônia, azedinha	hb
<i>Begonia radicans</i> Vell.	begônia, azedinha	tp
<b>família Bignoniaceae</b>		
<i>Anemopaegma chamberlainii</i> (Sims) Bir. var. <i>tenerius</i>	cipó-preto	tp
<i>Anemopaegma</i> sp.	---	tp
<i>Bignoniaceae</i> sp1	---	tp
<i>Crescentia cujete</i> L.	coité, cuieira	av
<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde, ipê-mandioca	av
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	av
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) Miers	unha-de-gato	tp
<i>Paragonia pyramidata</i> (L.C.Rich) Bureau	cipó	tp
<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	pente-de-macaco	tp
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker. Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	tp
<i>Tabebuia cassinoides</i> DC.	caxeta	av
<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo	ipê-roxo	av
<i>Tabebuia</i> sp1	---	av
<i>Tabebuia</i> sp2	---	av
<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith	ipê-amarelo-do-brejo	av
<b>família Bixaceae</b>		
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	ab
<b>família Bombacaceae</b>		
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) Rob.	embiruçu	av
<i>Spirotheca passifloroides</i> Cuatr.	paineirinha-vermelha	ep
<b>família Boraginaceae</b>		
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	louro-mole	av
<i>Cordia verbenacea</i> DC.	baleeira, erva-baleeira	hb
<i>Tournefortia</i> sp.	---	tp
<b>família Bromeliaceae</b>		
<i>Aechmea gamosepala</i> Wittm.	bromélia	ep
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	bromélia	ep
<i>Aechmea organensis</i> Wawra	bromélia	ep
<i>Aechmea ornata</i> Baker	gravatá	ep
<i>Aechmea pectinata</i> Baker	---	ep
<i>Annanas comosus</i> (L.) Merril	abacaxi	ep
<i>Bilbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	gravatá, caraguatá	ep
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	gravatá, bananinha-do-mato	hb
<i>Bromeliaceae</i> sp1	---	ep
<i>Bromeliaceae</i> sp2	---	ep
<i>Edmundoa lindenii</i> (Regel) E. Leme	bromélia	ep
<i>Neoregelia</i> sp.	ninho-de-passarinho	ep
<i>Nidularium campoallegrense</i> Tardivo	---	ep
<i>Nidularium innocentii</i> (Mez) Smith	bromélia	ep
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	bromélia	ep
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	cravo-do-mato	ep
<i>Tillandsia spiculosa</i> Griseb.	bromélia	ep
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	cravo-do-mato	ep

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Tillandsia usneoides</i> L.	barba-de-pau, barba-de-velho	ep
<i>Vriesea atra</i> Mez	---	ep
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	bromélia	ep
<i>Vriesea drepanocarpa</i> (Baker) Mez	---	ep
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer	---	ep
<i>Vriesea flammea</i> L.B.Sm.	bromélia	ep
<i>Vriesea friburgensis</i> Mez	bromélia	ep
<i>Vriesea gigantea</i> Gaudich.	bromélia	ep
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	ep
<i>Vriesea phillipoccoburgii</i> Wawra	bromélia	ep
<i>Vriesea platynema</i> Gaudich.	bromélia	ep
<i>Vriesea procera</i> (Mart. ex Schult.) Witt.	bromélia	ep
<i>Vriesea rodigasiana</i> E. Morris	bromélia	ep
<i>Vriesea</i> sp.	---	ep
<i>Vriesea vagans</i> (L. B. Sm.) L. B. Sm.	bromélia	ep
<b>família Buddlejaceae</b>		
<i>Buddleja brasiliensis</i> Jacq. ex Spreng.	barbasco	hb
<b>família Burseraceae</b>		
<i>Protium kleinii</i> Cuatr.	almécega, almesca	av
<b>família Cactaceae</b>		
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	rabo-de-rato	ep
<i>Rhipsalis eliptica</i> Lindb.	cacto-pendente	ep
<i>Rhipsalis floccosa</i> Salm.-Dyck ex Pfeif.	---	ep
<i>Rhipsalis pachyptera</i> Pfeiff.	comambaia	ep
<i>Rhipsalis rhombea</i> (Salm-Dyck) Pfeif.	---	ep
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	---	ep
<b>família Caesalpiniaceae</b>		
<i>Bauhinia forficata</i> Link	pata-de-vaca	av
<i>Bauhinia</i> sp1	---	tp
<i>Caesalpiniaceae</i> sp1	---	av
<i>Cassia</i> sp.	---	av
<i>Schizolobium parahyba</i> Blake	guapuruvu	av
<i>Senna cf. spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	av
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby	cássia-multijuga	av
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	abotinha, fedegoso	av
<b>família Campanulaceae</b>		
<i>Hippobroma longiflora</i> Presl	arrebenta-boi, cega-olho	hb
<b>família Canellaceae</b>		
<i>Cinnamodendron dinisii</i> (Schwacke) Occh.	pimenteira	av
<b>família Cannaceae</b>		
<i>Canna limbata</i> Roscoe	beri-silvestre	hb
<b>família Caricaceae</b>		
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	jacaratiá, mamão-do-mato	av
<b>família Cecropiaceae</b>		
<i>Cecropia glaziouvii</i>	embaúba-vermelha	av
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	av
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	embaúba-do-norte	av
<b>família Celastraceae</b>		
<i>Maytenus schumanniana</i> Loes.	sustento, cuinha	av
<b>família Chloranthaceae</b>		

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart.	chá-de-bugre, cidreira	av
<b>família Chrysobalanaceae</b>		
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex A.P. DC.	cinzeiro, ubá, uvá-de-facho	av
<b>família Clethraceae</b>		
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca, caujuja	av
<b>família Clusiaceae</b>		
<i>Calophyllum brasiliense</i> Camb.	guanando, olandi	av
<i>Clusia criuva</i> Camb.	criúva, mangue-do-mato, mangue-bravo	av / ep
<i>Garcinia Gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacopari	av
<i>Heimia myrtophylla</i> Cham. & Schltdl.	---	hb
<b>família Combretaceae</b>		
<i>Buchenavia kleinii</i> Exell	guarajuva	av
<i>Laguncularia racemosa</i> Gardn.	mangue-branco	av
<b>família Commelinaceae</b>		
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	trapoeraba	hb
<i>Commelina robusta</i> Kunth	---	hb
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	---	hb
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mik.	cana-de-macaco, gengibre-azul	hb
<i>Tradescantia</i> sp.	---	hb
<b>família Convolvulaceae</b>		
<i>Convolvulaceae</i> sp1	---	tp
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Burl.	corda-de-viola, corriola, jitirana	tp
<i>Jacquemontia blanchetii</i> Moric.	---	tp
<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hall.	---	tp
<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f.	---	tp
<b>família Costaceae</b>		
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-do-brejo, cana-de-macaco-vermelha	hb
<b>família Cucurbitaceae</b>		
Indeterminada 1	---	tp
<b>família Cyclanthaceae</b>		
<i>Asplundia</i> sp.	---	ab
<b>família Cyperaceae</b>		
<i>Becquerelia muricata</i> Nees	---	hb
<i>Bulbostylis</i> sp.	---	hb
<i>Calyptrocarya longifolia</i> Kunth	---	hb
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl ssp. <i>jamaicense</i> (Crantz) Kük.	---	hb
<i>Cyperus laetus</i> Kunth ssp. <i>oostachyus</i> (Nees) Kük.	junquinho	hb
<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	capim-agreste	hb
<i>Cyperus ferax</i> Rich.	junco	hb
<i>Cyperus ligularis</i> L.	---	hb
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rottb. ex Retz.	---	hb
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	---	hb
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kük.	tiririca	hb
<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Eleocharis montana</i> Roem. & Schult.	---	hb
<i>Eleocharis nana</i> Kunth	---	hb
<i>Eleocharis</i> sp.	---	hb
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl	---	hb
<i>Fuirena robusta</i> Kunth	---	hb

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Rynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	---	hb
<i>Scirpus californicus</i> (C.A.Meg.) Stend.	totora	hb
<i>Scirpus maritimus</i> L.	---	hb
<i>Scleria latifolia</i> Sw.	trigo-guarani	hb
<i>Scleria</i> sp.	---	hb
<i>Scleria uleana</i> Boeck. ex C.B. Clarke	---	hb
<b>família Dilleniaceae</b>		
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	lixeirinha, cipó-caboclo, cipó-carijó	tp
<i>Doliocarpus schottianus</i> Eichler	---	tp
<b>família Dioscoreaceae</b>		
<i>Dioscorea</i> sp.	cará, cará-do-mato, cará-tinga	tp
<b>família Ebenaceae</b>		
<i>Dyopyros cf. inconstans</i> Jacq.	maria-preta, fruto-de-jacu-macho	av
<b>família Elaeocarpaceae</b>		
<i>Sloanea garckeana</i> K. Schum.	laranjeira-do-mato, urucurana	av
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato	av
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	sapopema, carrapicheira	av
<b>família Ericaceae</b>		
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> Meisn.	mirtilo-brasileiro, groselha-do-brejo	ab
<b>família Eriocaulaceae</b>		
<i>Eriocaulon</i> sp.	---	hb
<b>família Erythroxylaceae</b>		
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) Schult.	fruta-de-pomba	av
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	fruta-de-pomba, cocão	av
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	cocão, baga-de-pomba	av
<b>família Euphorbiaceae</b>		
<i>Actinostemon concolor</i> Müll. Arg.	laranjeira-do-mato, laranjeira-do-banhado	av
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	tanheiro	av
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tanheiro	av
<i>Aparisthium cordatum</i> Baill.	pau-de-facho, pau-sandra	av
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	licurana, lucurana	av
<i>Maprounea brasiliensis</i> A. St.-Hil.	leiteiro, mata-berne	av
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	sobragirana, figueirinha	av
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) M. Johns.	mata-olho	av
<i>Pausandra morisiana</i> (Casar.) Radlk.	almecega-vermelha	av
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.	sapateiro, tamanqueira	av
<i>Phillanthus niruri</i> L.	quebra-pedra, erva-pombinha, sarandi-branco	hb
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	ab
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	leiteiro, pau-de-leite	av
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) Smith & Downs	branquinho	av
<i>Sebastiania corniculata</i> (Vahl) Müll.Arg.	falsa-guanxuma, guanxuma-de-chifre	hb
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp. & Endl.	canemuçu, embirão, peloteira	av
<b>família Fabaceae</b>		
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) J.F.Macbr.	angelim	av
<i>Canavalia bonariensis</i> Lindl.	---	tp
<i>Centrolobium microchaete</i> (Mart. ex Benth.) Lima	araruva	av
<i>Dahlstedtia pentaphylla</i> (Taub.) Burkart	timbozinho	ab
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	rabo-de-bugio	tp
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	trevinho-do-campo, pega-pega-graúdo	hb
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	pega-pega	hb

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Desmodium incanum</i> DC.	pega-pega, mata-pasto, amor-do-campo	hb
<i>Dioclea</i> sp.	estojo-de-luneta	tp
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	eritrina-candelabro, mulungu	av
<i>Fabaceae</i> sp1	---	av
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	pau-sangue	av
<i>Machaerium hatschbachii</i> Rudd	---	av
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stelfeld	bico-de-pato	av
<i>Machaerium uncinatum</i> Benth. (aff)	---	av
<i>Mucuna urens</i> DC.	coronha, olho-de-boi, olho-de-burro	tp
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	cobreúva	av
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harm.	coronheira, olho-de-cabra	av
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	jacarandá-do-litoral	av
<i>Pterocarpus violaceus</i> Vogel	pau-de-sangue, sangueiro	av
<i>Vigna longifolia</i> (Benth.) Verdc.	---	tp
<i>Vigna luteola</i> A. Gray	---	tp
<i>Zollernia latifolia</i> Smith	---	av
<b>família Flacourtiaceae</b>		
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guaçatunga, guaçatunga-branca	av
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	cambróé, guaçatunga	av
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	carvalhinho, chá-de-bugre	av
<b>família Gesneriaceae</b>		
<i>Codonanthe devosiana</i> Lem.	---	ep
<i>Codonanthe gracilis</i> (Mart.) Hanst.	---	ep
<i>Nematanthus fissus</i> (Vell.) L.E. Skog.	juquitiba	ep
<i>Nematanthus jolyanus</i> (Handro) Chautems	---	ep
<i>Nematanthus tessmannii</i> (Hoehne) Chautems	---	ep
<b>família Haloragaceae</b>		
<i>Myriophyllum aquaticum</i> Camb.	---	hb
<b>família Heliconiaceae</b>		
<i>Heliconia velloziana</i> Emygdio	caeté, bico-de-papagaio	hb
<b>família Humiriaceae</b>		
<i>Humiriastrum</i> sp.	---	av
<i>Vantanea compacta</i> (Schinzl.) Cuatrec.	guaraparim	av
<b>família Hydrocharitaceae</b>		
<i>Egeria densa</i> Planch.	elódea	hb
<b>família Iridaceae</b>		
<i>Crinum americanum</i> Ravenna	crino-americano, açucena	hb
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	tiririca-de-flor-amarela, falsa-tiririca	hb
<i>Iris</i> sp.	íris	hb
<i>Neomarica candida</i>	íris-da-praia	hb
<b>família Juncaceae</b>		
<i>Juncus acutus</i> L.	junco-agudo	hb
<b>família Lamiaceae</b>		
<i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.	---	hb
<i>Lamiaceae</i> sp1	---	hb
<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	alfavaca-de-galinha	hb
<i>Ocimum selloi</i> Benth.	alfavaca	hb
<b>família Lauraceae</b>		
<i>Aiouea saligna</i> Meissn.	canela-vermelha	av
<i>Aniba firmula</i> (Nees) Mez	canela	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	canela-fogo	av
<i>Cryptocarya moschata</i> Ness & Mart.	canela-batalha, louro-precioso	av
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) Macbr.	canela-toiça, canela-sebo, canela-frade	av
<i>Nectandra leucantha</i> Nees	canela-seca, canela-branca	av
<i>Nectandra membranacea</i> Griseb.	canela-branca	av
<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees	canela-ferrugem, canela-amarela	av
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela-amarela	av
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	louro	av
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	canela-amarela, canela-amarela-de-cheiro	av
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	canela-preta, canela-bicha	av
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez	canela-sabão, canela-pimenta	av
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela-amarela	av
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Howher	sassafrás, canela-sassafrás	av
<i>Ocotea puberula</i> Nees	canela-guaicá, canela-sebo	av
<i>Ocotea pulchella</i> Mart.	canela-lageana, canela-do-brejo	av
<i>Ocotea</i> sp.	canela	av
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	---	av
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canelinha, canelhina-miúda	av
<b>família Lecythidaceae</b>		
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	cachimbo-de-macaco, estopeira, jequitibá	av
<b>família Lentibulariaceae</b>		
<i>Utricularia</i> sp.	---	hb
<i>Utricularia subulata</i> L.	boca-de-leão-do-banhado	hb
<b>família Loganiaceae</b>		
<i>Spigelia cf dusenii</i> L. B. Smith	---	hb
<i>Strychnos fulvotomentosa</i> Gilg.	---	ab
<i>Strychnos trinervis</i> (Vell.) Mart.	quina-cruzeiro	tp
<b>família Loranthaceae</b>		
<i>Loranthaceae</i> sp1	---	hp
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl) Eichl.	erva-de-passarinho, enxerto-de-passarinho	hp
<i>Phoradendron piperoides</i> Nutt.	erva-de-passarinho	hp
<i>Struthanthus vulgaris</i> Mart.	erva-de-passarinho	hp
<b>família Lythraceae</b>		
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbr.	sete-sangrias	hb
<b>família Magnoliaceae</b>		
<i>Talauma ovata</i> A. St.-Hil.	baguaçu, pinha-do-brejo	av
<b>família Malpighiaceae</b>		
<i>Bunchosia pallescens</i> Skottsb.	---	av
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> A. Juss.	---	tp
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A. Juss.	---	tp
<b>família Malvaceae</b>		
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	algodão-do-brejo, algodoeiro-da-praia	ab
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	malvavisco	ab
<i>Sida carpinifolia</i> L. f.	guanxuma	hb
<b>família Marantaceae</b>		
<i>Goeppertia aemula</i> (Körn.) Borchs. & S. Suárez	calateia	hb
<i>Calathea monophylla</i> (Vell.) Körn	---	hb
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	calateia-zebra, caeté	hb
<i>Ctenanthe compressa</i> (A. Dietr.) Eichl.	---	hb
<i>Maranta divaricata</i> Roscoe	---	hb

Táxons	Nome comum	Hábito
Marantaceae sp1	---	hb
Marantaceae sp2	---	hb
<b>família Marcgraviaceae</b>		
<i>Marcgravia polyantha</i> Delpino	hera-das-árvores	tp
<i>Norantea brasiliensis</i> Choisy	flor-dpapagaio	tp
<b>família Melastomataceae</b>		
<i>Bertolonia acuminata</i> Gardner	---	ep
<i>Bertolonia mosenii</i> Cogn.	---	ep
<i>Pleiochiton blepharodes</i> (DC.) Reginato et al.	pixirica	ep
<i>Clidemia</i> sp.	---	hb
<i>Leandra cardiophylla</i> Cogn.	pixirica	hb
<i>Leandra cordifolia</i> (Naudin) Cogn.	pixirica	hb
<i>Leandra melastomooides</i> Raddi	pixirica	hb
Melastomataceae sp1	---	hb
Melastomataceae sp2	---	hb
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	pixiricão	av
<i>Miconia cinerascens</i> var. <i>robusta</i> Wurdack	pixirica	av
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naud.	jacatirão	av
<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.	pixirica	av
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner	pixirica	av
<i>Miconia jucunda</i> (DC.) Triana	---	ab
<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	pixirica	av
<i>Miconia</i> sp1	---	ab
<i>Miconia</i> sp2	---	ab
<i>Miconia tristis</i> ssp. <i>australis</i> Wurdack	pixirica	av
<i>Mouriri chamissoana</i> Cogn.	mandapuá, guamirim-ripa	av
<i>Ossaea amygdaloïdes</i> (DC.) Triana	pixirica	hb
<i>Pleiochiton cf. ebracteatum</i> Triana	---	ep
<i>Pterolepis glomerata</i> (Rottb.) Miq.	---	hb
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	---	hb
<i>Tibouchina clinopodifolia</i> (DC) Cogn.	quaresmeirinha	hb
<i>Tibouchina pulchra</i> (Cham.) Cogn.	quaresmeira, manacá-da-serra	av
<i>Tibouchina trichopoda</i> (DC.) Baill.	quaresmeira, quaresmeira-do-brejo	ab
<b>família Meliaceae</b>		
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana, canharana	av
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro, cedro-rosa, cedrinho	av
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	pau-de-arco, camboatá, catiguá-morcego	av
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	cedrinho	av
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	baga-de-morcego	av
<i>Trichilia silvatica</i> DC.	café-do-mato	av
<i>Trichilia</i> sp.	---	av
<b>família Menispermaceae</b>		
<i>Abuta selloana</i> Eichl.	cipó-buta, butuá, baga-de-caboclo, uva-seca	tp
<b>família Menyanthaceae</b>		
<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	ninfeia	hb
<b>família Mimosaceae</b>		
<i>Abarema</i> sp.	raposeira-branca, fainha-seca	ab
<i>Inga</i> cf. <i>sessilis</i> DC.	ingá-macaco	av
<i>Inga</i> cf. <i>striata</i>	ingá	av
<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-cipó, ingá-de-metro, rabo-de-mico	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Inga luschnathiana</i> Benth.	---	av
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-feijão	av
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	av
<i>Mimosa pudica</i> L.	dorme-dorme, planta sensitiva, dormideira	hb
Mimosaceae sp1	---	hb
<i>Pseudopiptadenia warmingii</i> Benth.	cauvi	av
<b>família Myristicaceae</b>		
<i>Virola bicuhyba</i> Schott	bicuíba, candeia-de-caboclo, bocuva	av
<b>família Monimiaceae</b>		
<i>Mollinedia argyrogyna</i> Perkins	---	av
<i>Mollinedia blumenaviana</i> Perkins	pimenteira	ab
<i>Mollinedia jorgearum</i> Peixoto	---	av
<i>Mollinedia schottiana</i> Perkins	pimenteira, capixim	ab
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	pimenteira, capixim	ab
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antonio, capixim	ab
<b>família Moraceae</b>		
<i>Brosimum glaucum</i> Taub.	---	av
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	---	av
<i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C.C. Berg	muiratinga, leiteira, inharé	av
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	av / ep
<i>Dorstenia hirta</i> Desv.	caiapá-hirto	hb
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & Bouché	gameleira-branca	av / ep
<i>Ficus insipida</i> Willd.	caxinguba	av / ep
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-branca	av / ep
<i>Ficus</i> sp1	---	av / ep
<i>Ficus</i> sp2	---	av / ep
<i>Ficus</i> sp3	---	av / ep
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burg., Lanj. & Boer	chincho, canxim, capiricica	av
<b>família Myrsinaceae</b>		
<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	---	ab
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	av
<i>Myrsine intermedia</i> Pipoly.	---	av
<i>Myrsine parvifolia</i> A. DC.	capororoca, capororoca-do-banhado	av
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	av
<i>Myrsine venosa</i> A. DC.	---	av
<b>família Myrtaceae</b>		
<i>Calycorectes australis</i> Legrand	---	av
<i>Calycorectes sellowiana</i> Berg	---	av
<i>Calyptranthes concinna</i> DC.	guamirim	av
<i>Calyptranthes grandifolia</i> Berg	guamirim	av
<i>Calyptranthes lanceolata</i> Berg var. <i>catharinensis</i> Legrand	---	av
<i>Calyptranthes lucida</i> Berg var. <i>polyantha</i> (Berg) Legrand	guamirim	av
<i>Calyptranthes strigipes</i> Berg	guamirim-chorão	av
<i>Campomanesia neriflora</i> (Berg) Nied.	---	av
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg	guabiroba	av
<i>Eugenia catharinensis</i> Legrand	guamirim	av
<i>Eugenia cf candolleana</i> DC.	cambuí-roxo, araçá-da-mata	av
<i>Eugenia cf subavenia</i> Berg	---	av
<i>Eugenia cf. burkartiana</i> (Legrand) Legrand	guamirim	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Eugenia cf. neoaustralis</i> Sobral	guamirim	av
<i>Eugenia jambos</i> L.	---	av
<i>Eugenia multicostata</i> Legrand	araçá-piranga, pau-alazão	av
<i>Eugenia obovata</i> Berg	---	av
<i>Eugenia</i> sp1	---	av
<i>Eugenia</i> sp2	---	av
<i>Eugenia</i> sp3	---	av
<i>Eugenia stigmatosa</i> DC.	guardimi	av
<i>Eugenia subavenia</i> Berg	---	av
<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.	pitanga-preta	av
<i>Eugenia umbelliflora</i> Berg	guapê, baguaçu	av
<i>Gomidesia cf. tijucensis</i> (Kiaersk.) Legrand	---	av
<i>Marlierea eugenioloides</i> (Legrand & Kausel) Legrand	guamirim, guamirim-branco	av
<i>Marlierea reitzii</i> Legrand	---	av
<i>Marlierea sylvatica</i> (Berg) Kiaersk.	araçarana	av
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	guarapuruna	av
<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) Berg	araçarana	av
<i>Myrceugenia reitzii</i> Legr. & Kaus.	---	av
<i>Myrcia acuminatissima</i> Berg	batitô	av
<i>Myrcia bicarinata</i> (Berg) Legrand	---	av
<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.	guamirim	av
<i>Myrcia cf. dichrophylla</i> Legrand	---	av
<i>Myrcia cf. dilucida</i> G.M.Barroso	---	av
<i>Myrcia flagellaris</i> (D.Legrand) Sobral	---	av
<i>Myrcia formosiana</i> DC.	---	av
<i>Myrcia glabra</i> (Berg) Legrand	guamirim	av
<i>Myrcia insularis</i> Gardn.	---	av
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC. var. <i>glaucescens</i> (Berg) Legrand	pedra-ume-caá	av
<i>Myrcia palustris</i> DC.	pitangueira-do-mato	av
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq	goiabão	av
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq. var. <i>pubipetala</i>	goiabão	av
<i>Myrcia pubipetala</i> var. <i>magnifolia</i> Legrand	goiabão	av
<i>Myrcia richardiana</i> Kiaersk.	guamirim	av
<i>Myrcia spectabilis</i> DC.	ameixa-do-mato	av
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim	av
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim	av
Myrtaceae sp1	---	av
Myrtaceae sp2	---	av
Myrtaceae sp3	---	av
Myrtaceae sp4	---	av
Myrtaceae sp5	---	av
Myrtaceae sp6	---	av
Myrtaceae sp7	---	av
Myrtaceae sp8	---	av
Myrtaceae sp9	---	av
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	av
<i>Plinia trunciflora</i> (Berg) Kausel	jaboticabeira	av
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<b>família Nyctaginaceae</b>		
<i>Guapira hirsuta</i> (Choisy) Lundell	maria-mole	ab
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	louro-branco, joão-mole, fruta-de-pombo	av
<i>Neea pendulina</i> Heimerl	maria-mole, maria-mole-pêndula	hb
<i>Neea schwackeana</i> Heimerl	maria-mole	hb
<i>Nyctaginaceae</i> sp1	---	hb
<i>Pisonia zapallo</i> Griseb.	anzol-de-lontra	av
<b>família Nymphaeaceae</b>		
<i>Nymphaea cf. rudgeana</i> G. Mey.	nenúfar	hb
<b>família Ochnaceae</b>		
<i>Ouratea parviflora</i> (DC.) Baill.	canela-de-veado, coração-de-bugre-vermelho	ab
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	---	hb
<b>família Olacaceae</b>		
<i>Heisteria silviani</i> Schwacke	casca-de-tatu	av
<b>família Oleaceae</b>		
<i>Tetrastylidium grandifolium</i> (Baill.) Sleum.	mandigaú, pau-tatu	av
<b>família Onagraceae</b>		
<i>Ludwigia cf. leptocarpa</i> (Nutt.) H. Hara	---	hb
<i>Ludwigia elegans</i> (Camb.) H.Hara	cruz-de-malta	hb
<i>Ludwigia suffruticosa</i> (L.) H.Hara	---	hb
<b>família Orchidaceae</b>		
<i>aff. Bifrenaria</i> sp.	---	ep
<i>Barbosella</i> sp.	---	ep
<i>Brassavola tuberculata</i> Hook.	orquídea	ep
<i>Campylocentrum cf. aromaticum</i> Barb. Rodr.	orquídea	ep
<i>Catasetum cernuum</i> (Lindl.) Rchb.f.	catasseto	ep
<i>Cattleya forbesii</i> Lindl.	orquídea	ep
<i>Dichaea anchorifera</i> Cogn.	---	ep
<i>Dichaea australis</i> Cogn.	---	ep
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	orquídea	ep
<i>Elleanthus brasiliensis</i> Rchb.f.	orquídea	ep
<i>Encyclia fragrans</i> (Sw.) Lemée	orquídea	ep
<i>Encyclia vespa</i> (Vell.) Pabst	orquídea	ep
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	boca-de-dragão	ep
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	orquídea	ep
<i>Epidendrum</i> sp2	orquídea	ep
<i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb.f.	orquídea	ep
<i>Gomesa crispa</i> Klotzsch & Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Gomesa</i> sp.	orquídea	ep
<i>Habenaria paranaensis</i> Hoehne	orquídea	hb
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	---	ep
<i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr.	---	ep
<i>Lankesterella ceracifolia</i> (Barb. Rodr.) Mansf.	---	ep
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Heterotaxis brasiliensis</i> (Brieger & Illg) F.Barros	orquídea	ep
<i>Maxillaria</i> sp.	---	ep
<i>Miltonia regnellii</i> Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Octomeria cf. gracilis</i> Lodd.	---	ep
<i>Octomeria fibrifera</i> Schltr.	---	ep
<i>Octomeria</i> sp1	---	ep

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Octomeria</i> sp2	---	ep
<i>Oncidium flexuosum</i> (Kunth) Lindl.	chuva-de-ouro, dama-dançante	ep
<i>Phisocyphon</i> sp.	---	ep
<i>Phymatidium microphyllum</i> Barb. Rodr.	---	ep
<i>Pleurothallis saundersiana</i> Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Pleurothallis</i> sp.	---	ep
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay	orquídea	ep
<i>Reichenbachanthus reflexus</i> Koll., Porto & Brade	---	ep
<i>Rodriguezia bracteata</i> (Vell.) Hoehne	---	ep
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.)Schltr.	---	ep
<i>Stelis</i> sp.	---	ep
<i>Vanilla chamissonis</i> Klotzsch	orquídea	ep
<i>Zygostates cornuta</i> Lindl.	---	ep
<b>família Oxalidaceae</b>		
<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	trevo, azedinha	hb
<b>família Passifloraceae</b>		
<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá	tp
<i>Passiflora</i> sp.	maracujá	tp
<b>família Phytolaccaceae</b>		
<i>Gallesia cf. integrifolia</i> (Spreng.) Harms	pau-de-alho, árvore-de-alho	av
<i>Phytolacca dioica</i> L.	umbu	av
<i>Seguieria langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	av
<b>família Piperaceae</b>		
<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.	---	ep
<i>Peperomia calophylla</i> Yunck.	---	hb
<i>Peperomia emarginella</i> (Sw.) DC.	---	ep
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	---	ep
<i>Peperomia obtusifolia</i> Miq.	---	ep
<i>Peperomia pereskiafolia</i> (Jacq.) Kunth	---	ep
<i>Peperomia pseudoestrellensis</i> C.DC.	---	ep
<i>Peperomia quadrifolia</i> Kunth	---	ep
<i>Peperomia</i> sp1	---	ep
<i>Peperomia</i> sp2	---	ep
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & Mey.	erva-de-vidro	ep
<i>Piper aduncum</i> L.	pariparoba	ab
<i>Piper amplum</i> Kunth	---	hb
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	pariparoba	ab
<i>Piper caldense</i> C. DC.	paguarandi, jaborandi	hb
<i>Piper cernuum</i> Vell.	pimenta-de-macaco	ab
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	pariparoba	hb
<i>Piper hispidum</i> C. DC.	---	hb
<i>Piper lindbergii</i> DC.	---	hb
<i>Piper miquelianum</i> DC.	---	hb
<i>Piper mollicomum</i> Kunth.	pariparoba, pau-de-junta	hb
<i>Piper solmsianum</i> DC.	caapeba, jaguarandi	hb
<i>Pothomorphe umbellata</i> (L.) Miq.	pariparoba, caapeba	hb
<b>família Poaceae</b>		
<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	---	hb
<i>Andropogon arenarius</i> Hack.	---	hb
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, capim andaime	hb

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Andropogon leucostachyus</i> H.B.K.	capim-membeca, capim-colchão	hb
<i>Chloris retusa</i> Lag.	capim-coqueirinho	hb
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Feddi	capim-amargoso, vassourinha, capim-açu	hb
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	---	hb
<i>Gynerium sagittatum</i> Beauv.	cana-brava	hb
<i>Imperata cf. contracta</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Hitch.	---	hb
<i>Imperata</i> sp.	---	hb
<i>Ischaemum minus</i> Presl.	---	hb
<i>Lasiacis ligulata</i> Hitch. & Chase	taquarinha, taquari	hb
<i>Merostachys</i> sp.	taquara	hb
<i>Olyra micrantha</i> H.B.K.	taquari	hb
<i>Oplismenus setarius</i> (Lam.) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Panicum laxum</i> Sw.	---	hb
<i>Panicum pilosum</i> Sw.	capim-de-anta	hb
<i>Panicum repens</i> L.	grama-de-ponta, grama-portuguesa	hb
<i>Dichanthelium sabulorum</i> (Lam.) Gould & C.A. Clark	---	hb
<i>Paspalum arenarium</i> Schrad.	---	hb
<i>Paspalum distichum</i> L.	---	hb
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	capim-rabo-de-raposa, rabo-de-gato	hb
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel	capim-pratuá, capim-do-mangue	hb
<i>Spartina ciliata</i> Brongn.	capim-das-dunas	hb
<i>Spartina densiflora</i> Brongn.	---	hb
<b>família Podocarpaceae</b>		
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Eichler	---	av
<b>família Polygalaceae</b>		
Indeterminada 1	---	hb
Indeterminada 2	---	hb
<i>Polygala cf. cyparissias</i> A. St.-Hil. & Moq.	gelol-da-praia	hb
<b>família Polygonaceae</b>		
<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth	erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum meisnerianum</i> Cham. & Schltl.	erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum persicaria</i> L.	erva-de-bicho, cataia, pimenta-d'água	hb
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	erva-de-bicho	hb
<b>família Pontederiaceae</b>		
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	aguapé	hb
<b>família Proteaceae</b>		
<i>Roupala</i> sp.	---	av
<b>família Quiinaceae</b>		
<i>Quiina glaziovii</i> Engl.	juruvarana, catuteiro-vermelho	av
<b>família Rhizophoraceae</b>		
<i>Rhizophora mangle</i> L.	mangue-vermelho	av
<b>família Rosaceae</b>		
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-do-mato, pessegueiro-bravo	av
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	amoreira-silvestre	tp
<b>família Rubiaceae</b>		
<i>aff. Spermacoce latifolia</i> Aubl.	erva-de-lagarto, erva-quente	hb
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K.Schum.	---	av
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	apuruzinho-do-mato, canela-de-veado	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Bathysa meridionalis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	macuqueiro	av
<i>Borreria verticillata</i> (L.) Mey.	vassourinha-de-botão, botão-branco	hb
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	cainca	tp
<i>Chomelia</i> sp.	viuvinha	ab
<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	---	hb
<i>Diodia radula</i> Cham. & Schltl.	erva-de-lagarto	hb
<i>Diodia saponariifolia</i> (Cham. & Schltl.) K. Schum.	poaia-do-brejo, perna-de-pomba	hb
<i>Diodia setigera</i> Spreng.	---	hb
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltl.) DC.	café-do-mato	hb
<i>Geophila repens</i> (L.) J. M. Johnston	moranguinho-do-mato, cauá-piri, cauá-pixi	hb
<i>Hilia illustris</i> (Vell.) K. Schum.	---	ep
<i>Hilia parasitica</i> Jacq.	---	ab
<i>Manettia cordifolia</i> Mart.	trepadeira-sanguínea	tp
<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	bacupari-miúdo	av
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	baga-de-macaco	ab
<i>Psychotria barbiflora</i> DC.	---	ab
<i>Psychotria birotula</i> Smith & Downs	maria-mole, erva-de-anta, pasto-de-anta	ab
<i>Psychotria carthagrenensis</i> Jacq.	carne-de-vaca, cafeiro-do-mato	ab
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltl.	cafeiro-do-mato	ab
<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schltl.) Wawra	grandiúva-d'anta, flor-de-cera	ab
<i>Psychotria pubigera</i> Schltl.	---	ab
<i>Psychotria</i> sp1	---	ab
<i>Psychotria</i> sp2	---	ab
<i>Psychotria</i> sp3	---	ab
<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez	poaia-branca, poaia	hb
Rubiaceae sp1	---	hb
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	véu-de-noiva, buquê-de-noiva	ab
<i>Rudgea villiflora</i> K.Schum. ex Stand.	---	ab
<i>Sabicea</i> sp.	---	tp
<b>família Rutaceae</b>		
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	cutia, cutia-amarela	av
<i>Metrodorea nigra</i> A. St.-Hil.	carrapateiro, chupa-ferro, pitaguará	av
<i>Pilocarpus pauciflorus</i> A. St.-Hil.	---	av
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-cadela	av
<b>família Sabiaceae</b>		
<i>Meliosma sellowii</i> Urb.	pau-fernandes	av
<b>família Sapindaceae</b>		
<i>Allophylus edulis</i> (A. St.-Hil.) Radlk.	chal-chal, aperta-goela, baga-de-morcego	av
<i>Allophylus petiolatus</i> Radlk.	vacum-de-folha-larga, chal-chal	av
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folha-grande	av
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá-branco	av
<i>Matayba juglandifolia</i> Radlkf.	camboatá-amarelo, pau-de-pombo	av
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	cipó-timbó	tp
<b>família Sapotaceae</b>		
<i>Chrysophyllum inornatum</i> Mart.	aguaí, aguaí-da-serra	av
<i>Chrysophyllum viride</i> Mart. & Eichler	aguaí	av
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba	av
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	pelote-de-macaco	av
<i>Pouteria durlandii</i> (Standley) Baehni ssp <i>durlandii</i>	---	av
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	pateiro, guapeva	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehnii	guacá-de-leite	av
Sapotaceae sp1	---	av
<b>família Schrophulariaceae</b>		
<i>Scoparia dulcis</i> L.	tupiçaba, vassourinha	hb
<b>família Smilacaceae</b>		
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	salsaparrilha	tp
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	salsaparrilha	tp
<b>família Solanaceae</b>		
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltdl.	baga-de-sabiá, marianeira, fruto-de-sabiá	ab
<i>Cestrum intermedium</i> Sednt.	coerana	ab
<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	joá, joá-melancia, mata-cavalo	hb
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	hb
<i>Solanum bstellatum</i> L.B. Smith & Downs	---	ab
<i>Solanum capsicoides</i> All.	joá-vermelho	hb
<i>Solanum flaccidum</i> Vell.	joá-cipó-cheiroso	tp
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	cuvitinga, fumo-bravo, fumeiro	av
<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	coerana, tintureiro, buquê-de-noiva, quineira	av
<i>Solanum</i> sp.	---	av
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-velame	ab
<i>Solanum viarum</i> Dunal	joá, mata-cavalo	ab
<b>família Sterculiaceae</b>		
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	amor-do-campo	hb
<b>família Symplocaceae</b>		
<i>Symplocos</i> sp.	---	av
<i>Symplocos laxiflora</i> Benth.	---	av
<b>família Theaceae</b>		
<i>Gordonia fruticosa</i> Schrad.	pau-de-santa-rita, santa-rita	av
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Camb.	pinta-moça	av
<b>família Thymelaeaceae</b>		
<i>Daphnopsis</i> sp.	---	ab
<b>família Typhaceae</b>		
<i>Typha dominguensis</i> Kunth	taboa	hb
<b>família Ulmaceae</b>		
<i>Celtis cf. tala</i> Gillies ex Planch.	esporão-de-galo, taleira	tp
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	grandiúva	av
<b>família Urticaceae</b>		
<i>Bohmeria caudata</i> Sw.	urtiga-mansa, assa-peixe, rami	ab
<i>Pilea cf. nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.	dinheiro-em-penca	hb
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	urtigão, urtigão-bravo	hb
<i>Urera nitida</i> (Vellozo) P. Brack	urtigão	hb
<b>família Verbenaceae</b>		
<i>Avicennia schaueriana</i> Stapf & Lechmere ex Moldenke	mangue-preto	av
<i>Cythereyllium myrianthum</i> Cham.	tucaneira	av
<i>Lantana camara</i> L.	camará, camaradinha	ab
<i>Lantana</i> sp.	---	ab
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N. E. Br.	cidrão, erva-cidreira, alecrim-do-mato	hb
<i>Verbena minutiflora</i> Briquet ex Moldenke	---	hb
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, maria-preta, azeitona-do-mato, tapinhoã	av

Táxons	Nome comum	Hábito
<b>família Vitaceae</b>		
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis ssp. <i>Verticillata</i>	cortina-japonesa	tp
<b>família Vochysiaceae</b>		
<i>Vochysia bifalcata</i> Warm.	guaricica, pau-amarelo, vinheiro	av
<b>família Xyridaceae</b>		
<i>Xyris cf. jupicai</i> Rich.	saguatajá, nhabutitana	hb

Tabela 2. Espécies de pteridófitas registradas na Reserva Natural Papagaio-da-cara-roxa.

Táxons	Nome comum
<b>família Aspleniaceae</b>	
<i>Asplenium cf. gastonis</i>	---
<i>Asplenium mucronatum</i>	---
<i>Asplenium scandicinum</i> Kaulf.	avenca-da-serra
<i>Asplenium serra</i> Langsd. & Fischer	---
<i>Asplenium</i> sp.	---
<b>família Azzolaceae</b>	
<i>Azzola caroliniana</i> Willd.	---
<b>família Blechnaceae</b>	
<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	---
<i>Blechnum occidentale</i> L.	---
<i>Blechnum serrulatum</i> Rich.	---
<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) Hook.	---
<b>família Cyatheaceae</b>	
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	xaxim
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	xaxim
<i>Cyathea leucofolis</i> Domin	---
<i>Cyathea phallerata</i> Mart.	---
<b>família Davalliaceae</b>	
<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Kreg	---
<b>família Dennstaedtiaceae</b>	
<i>Lindsaea bifida</i> (Kaulf.) Mett ex Kuhn	---
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd.	---
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	---
<b>família Dicksoniaceae</b>	
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim-bugio
<b>família Dryopteridaceae</b>	
<i>Diplazium cristatum</i> (Desr.) Alston	---
<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J. Smith	---
<i>Olfersia cervina</i> (L.) Kunze	---
<i>Polybotrya cylindrica</i> Kaulf.	---
<i>Rumorha adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching	samabaia-preta
<b>família Gleicheniaceae</b>	
<i>Dicranopteris pectinata</i> (Willd.) Under.	---
<i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching	Samambaia-das-taperas

Táxons	Nome comum
<b>família Grammitidaceae</b>	
<i>Cochlidium serrulatum</i> (Sw.) L.E.Bishop	---
<i>Lellingeria</i> sp.	---
<b>família Hymenophyllaceae</b>	
<i>Hymenophyllum asplenoides</i> (Sw.) Sw.	---
<i>Hymenophyllum fendlerianum</i> J.M. Sturm	---
<i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.	---
<i>Hymenophyllum</i> sp.	---
<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.	---
<i>Trichomanes hymenoides</i> Hedw.	---
<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev.	---
<i>Trichomanes pygidiferum</i> L.	---
<b>família Lomariopsidaceae</b>	
<i>Elaphoglossum crassinerve</i> (Kunze) T. Moore	---
<i>Elaphoglossum lingua</i> (C. Presl) Brack.	---
<i>Elaphoglossum macrophyllum</i> (Mett. Ex Kuhn) Christ	---
<i>Elaphoglossum ornatum</i> (Mett. Ex Kuhn) Christ	---
<i>Elaphoglossum subarborescens</i> Ros.	---
<i>Lomariopsis</i> sp.	---
<b>família Lycopodiaceae</b>	
<i>Huperzia flexibilis</i> (Fée) B. Øllg.	---
<i>Lycopodiella alopecuroides</i> (L.) Cranfill.	---
<i>Lycopodium</i> sp.	pinheirinho
<b>família Ophioglossaceae</b>	
<i>Ophioglossum palmatum</i> L.	---
<b>família Osmundaceae</b>	
<i>Osmunda palustris</i> Schrad.	---
<b>família Polypodiaceae</b>	
<i>Campyloneurum major</i> (Hieron. & Hicken) Lellinger.	---
<i>Campyloneurum</i> sp.	---
<i>Microgramma percussa</i> (Cav.) de la Sota	---
<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston	---
<i>Microgramma vaccinifolia</i> (Langsd. & Fisch.) Copel.	---
<i>Pecluma paradisea</i> (Langsd.& Fischer). M.G. price	---
<i>Pecluma recurvata</i> (Kaulf.) M.G. Price	---
<i>Pleopeltis angusta</i> Humb.& Bonpl. ex Willd.	---
<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) Fourn.	---
<i>Polypodium catharinae</i> Langsd. & Fisch.	---
<i>Polypodium fraxinifolium</i> Jacq.	---
<i>Polypodium hirsutissimum</i> Raddi	---
<i>Polypodium meniscifolium</i>	---
<i>Polypodium</i> sp1	---
<i>Polypodium</i> sp2	---
<b>família Pteridaceae</b>	
<i>Acrostichum danaefolium</i> Langsd. & Fisch.	---
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	---
<i>Pteris decurrentis</i> C. Presl	---
<i>Pteris vittata</i> L.	---
<b>família Salviniaceae</b>	
<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	---

Táxons	Nome comum
<b>família Schizaeaceae</b>	
<i>Anemia mandiocana</i> Hook.	---
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	---
<i>Lygodium volubile</i> Sw.	---
<i>Schizaea subtrijuga</i> Mart.	---
<b>família Selaginellaceae</b>	
<i>Selaginella cf. sulcata</i> (Desv. ex Poir.) Spring. ex Mart.	---
<i>Selaginella flexuosa</i> Spring	---
<b>família Tectariaceae</b>	
<i>Tectaria incisa</i> Cav.	---
<b>família Thelypteridaceae</b>	
<i>Thelypteris ptarmica</i> (Mett.) C.F. Reed	---
<i>Thelypteris vivipara</i> (Raddi) C.F. Reed	---
<b>família Vittariaceae</b>	
<i>Hecistoptyeris pumilla</i> (Spreng.) J. Sm	---
<i>Radiovittaria stipitata</i> (Kunze) Crane	---
<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.	---

Tabela 3. Espécies exóticas encontradas na Reserva Natural das Águas.

Táxons	Hábito	Nome comum
<b>família Amaranthaceae</b>		
<i>Amaranthus viridis</i> L.	hb	---
<b>família Annonaceae</b>		
<i>Annona squamosa</i> L.	av	condessa, fruta-do-conde
<b>Família Apiacea</b>		
<i>Centella asiatica</i>	hb	centela
<b>família Apocynaceae</b>		
<i>Allamanda cathartica</i> L.	ab	alamanda
<b>família Araceae</b>		
<i>Calladium x hortulanum</i> Birdsey	hb	caládio
<b>família Araucariaceae</b>		
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	av	araucária
<b>família Asparagaceae</b>		
<i>Dracaena fragrans</i>	ab	dracena
<b>família Balsaminaceae</b>		
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	hb	maria-sem-vergonha
<b>família Bignoniaceae</b>		
<i>Crescentia cujete</i> L.	av	cueira
<b>família Bixaceae</b>		
<i>Bixa orellana</i> L.	ab	urucum
<b>família Campanulaceae</b>		
<i>Isotoma longiflora</i> Presl	hb	---
<b>família Cannaceae</b>		
<i>Canna limbata</i> Roscoe	hb	biri
<b>família Commelinaceae</b>		
<i>Tradescantia zebrina</i> Hort. ex Loud.	hb	---
<b>família Fabaceae</b>		
<i>Trifolium repens</i>	hb	trevo-branco
<b>família Lauraceae</b>		
<i>Persea americana</i> Mill.	av	abacateiro
<b>família Magnoliaceae</b>		
<i>Magnolia betongensis</i> (Craib) H.Keng	av	magnólia
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	av	magnólia-sempre-verde
<i>Michelia champaca</i>	av	magnólia-amarela
<b>família Malpighiaceae</b>		
<i>Malpighia glabra</i> L.	ab	acerola
<b>família Malvaceae</b>		
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	ab	---
<b>família Moraceae</b>		
<i>Artocarpus integrifolia</i> L.f.	av	jaca
<i>Morus nigra</i> L.	av	amorinha
<b>família Musaceae</b>		
<i>Musa rosea</i> Baker	hb	bananeira-de-semente
<i>Musa X paradisiaca</i> L.	hb	bananeiras
<b>família Myrtaceae</b>		
<i>Eugenia uniflora</i> L.	av	pitangueira
<i>Psidium guajava</i> L.	av	goiaba
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	av	guapê

<b>família Phytolaccaceae</b>		
<i>Phytolacca americana</i> L.	hb	fitolaca, baga-moira
<b>família Pinaceae</b>		
<i>Pinus</i> sp.	av	pinus
<b>família Poaceae</b>		
<i>Brachiaria humidicola</i>	hb	braquiária
<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf	hb	braquiária
<i>Brachiaria procumbens</i>	hb	braquiária
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.	hb	---
<i>Chusquea</i> sp1	hb	criciúma
<i>Chusquea</i> sp2		bambu
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	hb	---
<i>Digitaria fuscescens</i> (Presl) Henrard	hb	---
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	hb	---
<i>Mellinis minutiflora</i> Beauv.	hb	---
<i>Panicum maximum</i> Jacq.	hb	---
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	hb	---
<b>família Rosaceae</b>		
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	av	nêspora
<b>família Rutaceae</b>		
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.	av	limoeiro
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	av	mixirica
<b>família Scrophulariaceae</b>		
<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	av	quiri
<b>família Verbenaceae</b>		
<i>Clerodendron speciosissimum</i> Paxton	ab	---
<i>Stachytarpheta maximilianii</i> Schranke	hb	gervão
<b>família Zingiberaceae</b>		
<i>Hedychium coccineum</i> Wall	hb	---
<i>Hedychium coronarium</i> Koehne	hb	lírio-do-brejo, jasmim